

医学教育网中医执业助理医师: 《答疑周刊》2023年第6期

问题索引:

1. 牛皮癣的皮损特点是什么?
2. 崩漏的特点是什么?
3. 生理性黄疸与病理性黄疸如何鉴别?

具体解答:

1. 牛皮癣的皮损特点是什么?

牛皮癣的皮损特点为

- A. 瘙痒性风团, 发无定处, 骤起骤退, 消退后不留任何痕迹
- B. 对称分布, 多形损害, 剧烈瘙痒
- C. 皮损呈圆形或多角形的扁平丘疹融合成片, 极易形成苔藓样变
- D. 皮损为暗红、淡紫色或皮肤色多角形扁平丘疹, 有蜡样光泽、网状纹
- E. 皮损为基底淡红色, 上覆银白色鳞屑, 剥后有薄膜现象和点状出血

**【答案】C**

**【解析】**牛皮癣的皮损特点: 皮损多为圆形或多角形的扁平丘疹融合成片, 剧烈瘙痒, 搔抓后皮损肥厚, 皮沟加深, 皮嵴隆起, 极易形成苔藓样变[医学教育网原创]。

2. 崩漏的特点是什么?

崩漏的临床特点是

- A. 行经期延长, 甚或淋漓半月方净
- B. 月经周期基本正常, 经量较正常明显增多
- C. 月经周期时或提前时或延长 7 天以上
- D. 月经的周期、经期、经量的严重失调
- E. 带下夹有血丝, 淋漓不止

**【答案】D**

**【解析】**崩漏是指经血非时暴下不止或淋沥不尽, 前者谓之崩中, 后者谓之漏下。崩漏属妇科常见病, 也是疑难急重病证。是因肾-天癸-冲任-胞宫生殖轴

严重紊乱，引起月经的周期、经期、经量严重失调，可导致不孕症 [医学教育网原创]。

### 3. 生理性黄疸与病理性黄疸如何鉴别？

下列属于病理性黄疸的是

- A. 生后 24h 以内出现黄疸
- B. 生后第 2~3 日出现黄疸，第 4~6 日达高峰
- C. 足月儿在生后 2 周消退，早产儿可延迟至 3~4 周消退
- D. 足月儿血清总胆红素 $\leq 221 \mu\text{mol/L}$ ，早产儿 $\leq 257 \mu\text{mol/L}$
- E. 小儿一般情况良好，除偶有轻微食欲不振外，不伴有其他临床症状

**【答案】A**

**【解析】**病理性黄疸：黄疸出现早（生后 24 小时以内）、发展快（血清总胆红素每日上升幅度 $>85.5 \mu\text{mol/L}$  或每小时上升幅度 $>8.5 \mu\text{mol/L}$ ）、程度重（足月儿血清总胆红素 $>221 \mu\text{mol/L}$ ，早产儿 $>257 \mu\text{mol/L}$ ）、消退迟（黄疸持续时间足月儿 $>2$  周，早产儿 $>4$  周）或黄疸退而复现。伴随各种临床症状。

生理性黄疸：生后第 2~3 日出现黄疸，第 4~6 日达高峰。足月儿在生后 2 周消退，早产儿可延迟至 3~4 周消退。黄疸程度轻（足月儿血清总胆红素 $\leq 221 \mu\text{mol/L}$ ，早产儿 $\leq 257 \mu\text{mol/L}$ ）。在此期间，小儿一般情况良好，除偶有轻微食欲不振外，不伴有其他临床症状[医学教育网原创]。