

护士执业资格考试《答疑周刊》2019 年第 39 期

1. 【问题】学员提问：嗜睡与昏睡的区别？

【解答】嗜睡：患者陷入持续的睡眠状态，可被唤醒，并能正确回答和做出各种反应，但刺激去除后很快又再入睡。

昏睡：患者处于熟睡状态，不易唤醒。在强烈刺激下可被唤醒，但很快又再入睡。醒时答话含糊或答非所问。

昏迷也可以再了解一下哦!!!

	浅昏迷	中度昏迷	深昏迷
对刺激反应	对声、光刺激无反应，对疼痛刺激尚有反应	对各种刺激均无反应，对剧烈刺激可有防御反射	对各种刺激全无反应
角膜反射	存在	减弱	消失
瞳孔对光反射	存在	迟钝	消失
眼球运动	存在	无	无
生命体征	无明显异常	轻度异常	明显异常
直肠膀胱功能	无明显异常	一定程度功能障碍	尿、便失禁

2. 【问题】学员提问：过失犯罪与疏忽大意和贻误罪该如何进行区分呢？都是因为疏忽大意造成，都有可能引起死亡？

【解答】过失犯罪是指应当预见自己的行为可能会发生危害的结果，因疏忽大意而没有预见，或虽有预见而轻信能够避免，以致发生不良结果。

疏忽大意是行为人因一时粗心或遗忘而造成客观上的过失行为。常由于护理人员在工作中不

专心细致所致，可导致两种结果，一种是损害了病人生活利益和健康恢复的进程；另一种是因失职导致病人残废或死亡。第一种结果构成了侵权行为，第二种结果构成了渎职罪。这三个名词确实容易混淆，那我们还是在字面上理解。

过失犯罪是当事人能预见自己的行为能会发生危害的结果，而疏忽大意的当事人没有预见。

关系：过失犯罪包含疏忽大意。

而渎职罪却是疏忽大意的结果，是导致病人残废或死亡的结果。关系：渎职罪是疏忽大意的结果。

3. 【问题】学员提问：流产和临产都会见红，如何区分？

【解答】临产开始的标志为有规律且逐渐增强的子宫收缩，持续 30 秒或以上，间歇 5~6 分钟，同时伴随进行性宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降。

凡妊娠不足 28 周、胎儿体重不足 1000g 而终止者，称为流产。发生于妊娠 12 周以前者称早期流产，发生在妊娠 12 周至不足 28 周者称晚期流产。

胎儿只有足月生产叫临产，不足 28 周见红是流产（胎儿是成活不了的），所以有孕周的不同。

4. 【问题】学员提问：乙型肝炎病毒病原学检测结果意义？

【解答】表面抗原（HBsAg）与表面抗体（抗-HBs）：HBsAg 阳性见于乙肝病毒（HBV）感染者。抗-HBs 阳性主要见于预防接种乙型肝炎疫苗后或过去感染 HBV 并产生免疫力的恢复者。

5. 【问题】学员提问：小儿传染病传染性总结？

【解答】①麻疹：出疹前 5 日至出疹后 5 日均有传染性。

②水痘：出疹前 1 日至疱疹全部结痂时均有传染性。

③流行性腮腺炎：腮腺肿大前 1 日至消肿后 3 日均具传染性。