


2019年《药学综合知识与技能》考情分析

一、2017、2018年与2019年分值比例比对分析



总体分析:

- (1) 2019 年各章节分值比例有所变化。
- ①2018年第三章、第四章一反常态仅考7分,但2019年再次调整,考试占20分,又回归到大分值章节的行列。
 - ②往年第八章的分值均在20分左右。今年分值下降至11分,下降趋势比较明显。
- ③往年第十二章不作为重点章节,但2019年考试占比为5分,考点主要集中在胃食管反流以及消化性溃疡,有成为重点章节的趋势。
- (2) 考题难度与 2018 年相比持平, 考题形式无明显改变, 依然以实际临床情况为切入点命题, 把理论与实践紧密的结合在一起。相较以往的考题, 今年题目的选项设计比较容易混淆, 这就需要考生对知识点的掌握更加精准。

总体来讲,《药学综合知识与技能》无重大变化,复习的重点仍是第二、三、四、八,九、十、十一、十三章八个章节,总分值达 91 分,仍是复习的主力军。

二、2019年考题分析

(一)课程与真题对比

2019年《药学综合知识与技能》基础班课程,考点覆盖率占90%。详细如下:

- 2. 关于处方开具和调剂的说法,正确的是
- A. 处方开具后7日内有效



- B. 调剂处方时应做到"四查十对"
- C. 调剂处方时"四查"是指查对药名、剂型、规格和数量
- D. 应使用淡红色处方开具第二类精神药品
- E. 工作 3 年及以上的执业医师可开具麻醉药品处方

答案: B

截图:



10. 患者, 男, 50 岁, 临床诊断为焦虑症, 给予氟西汀 20mg qd 治疗。对该患者用药教育的说法

错误的是





- A 不得随意自行调整氟西汀剂量
- B. 氟西汀应于睡前服用
- C. 不能突然停止服用氟西汀
- D. 服用氟西汀期间不能饮酒
- E. 氟西汀可能引起性功能障碍



截图:











- 24. 患者向药师咨询,停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中,正确的是
- A. 复方短效口服避孕药停药 6 个月后方可备孕
- B. 复方短效口服避孕药停药后即可备孕
- C. 复方短效口服避孕药停药 3 个月后方可备孕
- D. 长效避孕药停药后即可备孕
- E. 长效避孕药停药 3 个月后方可备孕

答案: B

医学教育网 截图: www.mod66.com





(二) 题库与真题对比

考题 6. 用药时官限制饮水的药物是



- A. 胶体果胶铋胶囊
- B. 环丙沙星片
- C. 利托那韦片
- D. 苯溴马隆胶囊
- E. 阿仑磷酸钠片

答案: A

题库截图:





36. 服用后不宜立即饮水的药品包括

- A.氨茶碱
- B.硫糖铝
- C.丙磺舒
- D.川贝止咳糖浆
- E.胶体果胶铋

【正确答案】 BDE

医学教育网

医学教育网

考题 11. 患者, 女, 29 岁, 孕 29¹⁶ 周, 血压 160/100mmHg, 尿蛋白(-), 该患者降压药应选用 www.med66.com

- A. 氨氯地平
- B. 甲基多巴
- C. 卡托普利
- D. 厄贝<mark>沙坦</mark>
- E. 哌唑嗪

答案: B

题库截图:

- 3. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是
- A.缬沙坦
- B.呋塞米
- C.赖诺普利
- D.甲基多巴
- E.维拉帕米

【正确答案】 D





考题 21. 艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗,俗称"鸡尾酒疗法",目前国内免费治疗 的一线方案是

A. 拉米夫定十替诺福韦+齐多夫定





- B. 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦
- C. 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦
- D. 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平
- E. 恩替卡韦+奈韦拉平+利托那韦

答案: D



题库截图:

- 3. 目前国内免费治疗艾滋病的一线方案为
- A.拉米夫定+利巴韦林+奈韦拉平
- B.齐多夫定+奈韦拉平+雷特格韦
- C. 奈韦拉平+洛匹那韦+雷特格韦
- D.齐多夫定+奈韦拉平+拉米夫定
- E.拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平





三、2020年的复习建议

明确复习的重点,仍以第二、三、四、八,九、十、十一、十三章等八个章节的复习为主。

明确复习思路,复习时要注重理论联系实际,活学活用。注重学习药物遴选原则的同时,还要关注药物的不良反应、禁忌症以及特殊人群的用药注意事项,以免落入陷阱。

最后,多看课、多做题、多分析,俗话说"书山有路勤为径",愿所有考生都能通过自己的努力,

成为一名合<mark>格的执业药师!</mark>

加油!









