

自主招聘 护理专业 模拟卷

一、单选题（A 型题）

1. 患儿，男性，4 岁。以病毒性脑膜炎入院。经积极治疗，除右侧肢体仍活动不利外，其他临床症状明显好转，家长要求回家休养，护士为其进行出院指导，不妥的是
 - A. 给予高热量、高蛋白、高维生素饮食
 - B. 患侧肢体保持功能位，尽量减少活动
 - C. 指导用药的注意事项
 - D. 保持患儿心情舒畅
2. 患者，女性，54 岁。心悸 2 小时来院急诊。查体：心率 125 次/分，脉率 105 次/分，心脏听诊心音强弱及快慢不等。考虑是
 - A. 窦性心动过速
 - B. 频发房性期前收缩
 - C. 阵发性室上性心动过速
 - D. 阵发性快速心房颤动
3. 患者，男性，60 岁，因高血压急症入院，护士遵医嘱静脉注射呋塞米（速尿）20mg。半小时后，患者出现乏力，腹胀，肠鸣音减弱的症状。该患者最可能的情况是
 - A. 高钾血症
 - B. 低钾血症
 - C. 低氯血症
 - D. 低钙血症
4. 患者的呕吐物内除消化液和食物外，还混有大量胆汁时，护士将其呕吐物的特点归纳为
 - A. 黄绿色
 - B. 褐色
 - C. 腥臭味
 - D. 咖啡色

5. 患者女，66 岁，慢性便秘 2 年，加重 1 周，遵医嘱给予稀释性泻剂治疗，护士应着重观察患者的
- A. 意识变化
B. 生命体征
C. 肢体活动情况
D. 水电解质情况
6. 患者男，70 岁，COPD 病史 20 年。近日感冒后病情加重，夜间咳嗽频繁，痰量多。查体，神志清，口唇轻度发绀，桶状胸，双肺叩诊过清音，呼吸音低，动脉血气分析： PaO_2 55mmHg， PaCO_2 60mmHg。经治疗后病情缓解，此时正确的健康指导是
- A. 适当锻炼，低糖低蛋白饮食
B. 避免感冒，长期使用抗生素
C. 加强营养，低糖低蛋白饮食
D. 避免感冒，进行缩唇呼吸及腹式呼吸
7. 患者女，30 岁，教师。诊断抑郁症。入院后临床主要表现为情绪低落，少言、自责、多卧床，有时哭泣，进食差伴早醒。责任护士在健康评估中，应首先关注的是
- A. 体重减轻
B. 进食量少
C. 活动量少
D. 睡眠障碍
8. 某甲状腺功能亢进患者，既往有哮喘病史，在制订治疗方案时，应禁用的药物是
- A. 甲硫氧嘧啶
B. 甲亢平
C. 地西洋
D. 普萘洛尔
9. 患者男，50 岁。胃大部切除术后第 1 天，医嘱记录出入液量，该患者每日能排出量的记录内容不包括
- A. 汗液
B. 尿量
C. 胃肠减压吸出液
D. 腹腔引流液
10. 患者女，46 岁，患风湿关节炎，自诉最近晨僵较严重，下列缓解晨僵的护理措施正确的是

- A. 早晨起床后先用冷水经浸泡僵硬关节然后按摩
B. 夜间睡眠时戴弹力手套保暖
C. 尽量不要活动僵硬的关节
D. 关节内可注射透明质酸
11. 患者，男，35岁，7小时前行阑尾切除术，现患者主诉下腹胀痛，护士观察其下腹膀胱区隆起，该护士判断患者最主要的护理问题是
- A. 便秘
B. 有感染的危险
C. 疼痛
D. 尿潴留
12. 患儿，男，6岁，来院时表情痛苦、呼吸急促、面颊潮红、鼻翼煽动。护士判断患儿此时面容为
- A. 甲亢面容
B. 急性面容
C. 慢性面容
D. 脱水面容
13. 患者男，52岁。近年来常有排尿中断现象，另有尿频、尿急和终末尿痛症状，诊断为尿道结石。行尿道取石术，术后并发症是
- A. 尿失禁
B. 膀胱挛缩
C. 肾积水
D. 尿道狭窄
14. 患者男，45岁。疑诊腰椎骨折。拟行X线摄片，需平车护送患者。移送患者上平车，其适合的搬运方法是
- A. 一人法
B. 二人法
C. 三人法
D. 四人法
15. 患儿，3岁，高热惊厥，在急诊科经止惊、给氧等紧急处理后，情况稳定，欲送儿科病房做进一步治疗。运送过程中最适宜的供氧装置是
- A. 氧气筒

- B. 氧气枕
- C. 中心管道
- D. 人工呼吸机

16. 某患者需输入 1000ml 液体，每分钟滴数为 50 滴，所用输液器的滴系数为 15，估计输完液体所用时间是

- A. 2 小时
- B. 5 小时
- C. 4 小时
- D. 3 小时

17. 消化性溃疡特征性的临床表现是

- A. 黄疸
- B. 食欲下降
- C. 恶心，呕吐
- D. 节律性和周期性上腹痛

18. 急性心肌梗死患者发病后 24 小时内主要的死亡原因是

- A. 心脏破裂
- B. 心律失常
- C. 心力衰竭
- D. 心源性休克

19. 脓性指头炎切开引流最佳切口

- A. 侧面横切口
- B. 侧面纵切口
- C. 掌面横切口
- D. 掌面纵切口

20. 有机磷中毒时，代谢失常的神经递质是

- A. 多巴胺
- B. 乙酰胆碱
- C. 5-羟色胺
- D. 肾上腺素

21. 护士为其患者发口服药时恰逢其外出，此时正确的做法是

- A. 等候患者
- B. 将药交给陪护
- C. 将药置于床头柜上
- D. 暂缓发药

22. 食管癌患者最典型的临床表现是

- A. 疼痛
- B. 异物感
- C. 呕血
- D. 进行性吞咽困难

23. 肝性脑病最具有特征性的体征是

- A. 腱反射亢进
- B. 肌张力增加
- C. 扑翼样震颤
- D. 踝阵挛

24. 骨质疏松最常见、最主要的症状是

- A. 疼痛
- B. 身长缩短
- C. 骨折
- D. 呼吸困难

25. 护士指导腰椎间盘突出患者在手术后早期即进行直腿抬高练习，其目的是为了预防
- A. 神经根粘连
B. 血肿形成
C. 骨质疏松
D. 伤口感染
26. 细菌性肝脓肿最常见的早期症状是
- A. 恶心
B. 黄疸
C. 贫血
D. 寒战、高热
27. 可能发生呼吸肌无力引起呼吸衰竭的疾病是
- A. 慢性阻塞性肺疾病
B. 重症支气管哮喘
C. 重症肺炎
D. 重症肌无力
28. 开放性脑损伤的主要表现不包括
- A. 硬脑膜破裂
B. 头皮裂伤
C. 脑积水
D. 脑脊液漏
29. 慢性便秘患者最主要的临床表现是
- A. 缺乏便意、排便艰难
B. 腹痛
C. 里急后重感
D. 恶心、呕吐
30. 不属于肺心病代偿期特征的临床表现是
- A. 发绀
B. 呼吸困难
C. 颈静脉充盈
D. 主动脉瓣第一心音亢进
31. 护士在给患者做心电图时，V4 导联正确的放置位置是
- A. 胸骨左缘第 4 肋间
B. 左腋前线第 5 肋间
C. 左锁骨中线第 5 肋间
D. 左腋前线第 4 肋间
32. 系统性红斑狼疮最常见受损器官是

- A. 心
B. 肝
C. 肾
D. 肺
33. I 型呼吸衰竭主要见于
A. 肺泡血量不足
B. 肺泡通气不足
C. 氧耗量不足
D. 肺换气功能障碍
34. 肾脏的基本功能单位是
A. 肾小管
B. 肾小体
C. 肾皮质
D. 肾单位
35. 孕妇自我监测胎儿安危最简单有效的方法是
A. 胎动计数
B. 计算孕龄
C. 测量体重
D. 睡眠情况
36. 肝癌按组织细胞分型，最常见的类型是
A. 混合型
B. 胆管细胞型
C. 肝细胞型
D. 结节型
37. 无菌盘在未污染的情况下可使用
A. 1 小时
B. 4 小时
C. 8 小时
D. 12 小时
38. 治疗猩红热的首选抗菌药物是
A. 头孢菌素
B. 庆大霉素
C. 红霉素
D. 青霉素
39. 心脏骤停患者的心电图表现，最常见的是
A. 心室扑动或颤动
B. 心室停顿
C. 室性心动过速
D. 无脉性电活动

46. 患者男，30岁，因慢性肾小球肾炎入院。目前主要临床表现为眼睑及双下肢轻度水肿，血压150/100mmHg。护士观察病情中应重点关注
- A. 精神状态
B. 水肿情况
C. 血压变化
D. 心率变化
47. 患者女，26岁，反复发生皮肤黏膜瘀点，瘀斑入院，诊断为特发性血小板减少性紫癜，住院期间护士发现患者出现脉搏增快，视力模糊，瞳孔大小不等，患者可能出现了
- A. 心力衰竭
B. 眼部疾病
C. 颅内出血
D. 消化道出血
48. 患者男，23岁。车祸30分钟后，因出现极度呼吸困难送来急诊。查体：右胸部饱满。呼吸音消失，叩诊呈鼓音，右胸部有骨擦音，皮下气肿。首要的急救措施是
- A. 输血，输液
B. 镇静，吸氧
C. 胸壁固定
D. 胸腔穿刺排气
49. 患者，男性，46岁，急性胆囊炎入院。患者住院期间，病案中排列在最前面的是
- A. 医嘱单
B. 体温单
C. 病程记录
D. 病史和体格检查单
50. 急性腮腺炎患儿，4岁，无任何并发症，社区护士建议其隔离方式是
- A. 呼吸道隔离
B. 保护性隔离
C. 体液隔离
D. 家中隔离

二、多选题（X型题）

1. 下列大肠癌手术术式中，不属于姑息性手术的是
- A. 右半结肠切除术
B. Miles术

- C. 左半结肠切除术
D. 短路手术
2. 正常小儿中性粒细胞和淋巴细胞比例相等的时间分别为
- A. 出生后 4~6 天
B. 出生后 4~6 周
C. 出生后 4~6 月
D. 出生后 4~6 岁
3. 患者男，59 岁，因脑血出血入院，入院第 3 天腰穿示颅内压增高，遵医嘱静脉滴注 20%甘露醇 250ml。下列描述不正确的是
- A. 按血压高低调节滴注速度
B. 滴速宜慢
C. 快速滴注
D. 低速度宜极慢
4. 患者，男，65 岁，左下肢膝关节置换术后，护士给其擦浴。擦浴程序正确的是
- A. 关好门窗，调节室温
B. 先擦上身再下身
C. 脱衣时，先患侧再健侧
D. 脱衣时，先健侧再患侧
5. 各种流产的临床特点，不正确的是
- A. 完全流产：腹痛，宫口松
B. 先兆流产：宫口未开，阴道出血量少于月经量
C. 难免流产：阴道出血少，未破水
D. 不全流产：宫口闭，阴道出血减少
6. 急诊护士在抢救过程中，不正确的是
- A. 任何情况下，护士不执行口头医嘱
B. 抢救完毕，请医生第 2 天补写医嘱与处方
C. 输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
D. 急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
7. 需要采取甲类传染病的预防和控制措施的疾病包括
- A. 非典
B. 霍乱

- C. 肺炭疽
D. 猩红热
8. 给缺铁性贫血病人补铁，护士指导病人，病人复述有关口服铁剂的注意事项，正确的是
- A. 症状改善后可停药
B. 避免铁剂溶液与牛奶同服
C. 服用铁剂前后 1h 禁饮浓茶
D. 服铁剂溶液时要用吸管吸入咽下
9. 关于脑室引流的护理，下列叙述正确的是
- A. 引流量每日不超过 500ml
B. 如引流不畅，不可用盐水冲洗
C. 拔除引流管前先做 CT，夹管 1~2 天
D. 妥善固定，引流管开口低于侧脑室平面
10. 护士与哭泣的患者交流时，方法正确的是
- A. 安慰并阻止患者哭泣
B. 待患者平静下来可主动聆听
C. 鼓励其将哭泣的原因说出来
D. 不能训斥、评论患者
11. 下列属于试验饮食的是
- A. 潜血试验饮食
B. 胆囊造影饮食
C. 忌碘饮食
D. 低胆固醇饮食
12. 输卵管通液检查的禁忌情况不包括
- A. 月经干净 5 天
B. 术前体温 36.8℃
C. 阴道炎治疗中
D. 婚后 2 年不孕
13. 患者，男性，39 岁，因农药中毒急诊入院。用平车护送患者入病区时，对静脉输液管、吸氧管采取的处理措施不正确的是
- A. 暂时拔除导管
B. 加固导管，继续治疗，维持导管通畅
C. 加固导管，途中暂停吸氧、输液
D. 维持输液通畅，暂时拔除吸氧管

14. 护士对患者进行评估时，属于资料来源的选项是
- A. 患者及家属
B. 护士的判断
C. 各种检查报告单
D. 病历
15. 患者女性，35 岁。诊断为“肝外胆管结石”，出现重度黄疸及皮肤瘙痒，对皮肤的护理措施恰当的是
- A. 可用手抓挠
B. 遵医嘱用药
C. 保持皮肤清洁
D. 防止皮肤损伤
16. 对腹外疝患者进行出院指导，不正确的内容是
- A. 1 个月内避免重体力劳动
B. 3 个月内避免重体力劳动
C. 半年内避免重体力劳动
D. 术后不会复发，可任意活动
17. 病毒性心肌炎患者的治疗要点包括
- A. 预防心力衰竭
B. 抗生素治疗
C. 抗病毒治疗
D. 急性期卧床休息
18. 关于小儿前凶的描述，不正确的是
- A. 早闭或过小见于佝偻病
B. 凹陷见于颅内压增高
C. 有的小儿出生时已闭合
D. 出生时大约为 $3\text{cm} \times 3\text{cm}$
19. 护士评估肝硬化患者的皮肤改变时可发现蜘蛛痣，蜘蛛痣一般出现的部位是
- A. 手臂
B. 胸部
C. 面颈部
D. 腹部
20. 关于产褥感染的护理措施，正确的叙述是
- A. 保证足够液体摄入
B. 每 4 小时测体温 1 次
C. 给予高蛋白饮食
D. 产妇取平卧臀部抬高

三、判断题

1. 胰腺癌最常见的发生部位是胰尾部。
对 错
2. 老鼠药磷化锌中毒后应选用鸡蛋、牛奶进行洗胃。
对 错
3. 甲肝传播途径为血液、体液传播。
对 错
4. 肛门排气应插入 15~18cm。
对 错
5. 破伤风最先受累的肌肉是咀嚼肌。
对 错
6. 特殊感染性垃圾应选择单层黄色垃圾袋。
对 错
7. 心脏复苏的首选药物是肾上腺素。
对 错
8. 壁细胞主要分泌胃蛋白酶。
对 错
9. 肺结核病人的餐具应该选择喷雾消毒。
对 错
10. 肺炎最常见的病原体是细菌。
对 错

备考 QQ 交流群：1085586275



微信公众号：正保卫生事业单位招聘考试