

1. 右上腹剧痛、寒战高热、黄疸，被称为

- A. Dubin-Johnson 三联征
- B. Charcot 三联征
- C. Rotor 三联征
- D. Gilbert 综合征
- E. Crigle-Najjar 综合征

2. 女，40 岁。6 小时前进食油腻食物后突发右上腹持续性疼痛，阵发性加重，伴恶心，呕吐胃内容物 1 次，疼痛向右肩部放射。查体：T 38.0℃，P 100 次/分，BP 130/80 mmHg。皮肤巩膜无黄染，右上腹有压痛、反跳痛，轻度肌紧张，墨菲（Murphy）征阳性。下一步首选的检查是

- A. 腹部超声
- B. 立位腹平片
- C. 腹部增强 CT
- D. 尿淀粉酶检测
- E. 诊断性腹腔穿刺

（3~4 题共用题干）

女，51 岁。饱餐后持续性上腹剧烈痛 10 小时，疼痛向腰部放射，伴呕吐，呕吐后症状无缓解。既往曾诊断为“胆石病”，未治疗。查体：腹部平坦，中上腹有深压痛，无反跳痛，肠鸣音减弱。

3. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性胃炎
- B. 急性肠梗阻
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胃穿孔

4. 对诊断最有帮助的辅助检查是

- A. 急诊胃镜
- B. 血清淀粉酶
- C. 立位腹平片
- D. 上消化道造影
- E. 尿常规、尿细菌培养

5. 男，47 岁。进食油腻饮食后中上腹持续疼痛 7 小时，频繁呕吐伴发热，排气排便正常，查体：T 38.7℃，巩膜无黄染，上腹部肌紧张，中上腹压痛（+），Murphy 征（-），移动性浊音（-）。化验血 WBC  $17.1 \times 10^9/L$ ，立位腹平片检查：膈下未见游离性气体，未见肠管扩张及气液平。最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 胃溃疡穿孔
- D. 急性心肌梗死
- E. 绞窄性肠梗阻

6. 女，30 岁。发热、腰痛伴尿频、尿急、尿痛 2 天。尿沉渣镜检：白细胞 30~50 个/高倍视野，红细胞 5~10 个/高倍视野。最可能的诊断是

- A. 尿道综合征
- B. 尿路感染
- C. 尿路结石
- D. 肾结石
- E. 膀胱癌

7. 女，60 岁。发热伴尿频、尿急 3 天。既往史无类似发作史。查体：T 38.2℃，左侧肾区有叩击痛，血常规：WBC  $12.5 \times 10^9/L$ ，N 0.85，血红蛋白 123g/L，血小板  $123 \times 10^9/L$ 。尿常规：蛋白微量，沉渣镜检红细胞 2~3 个/高倍视野，白细胞 40~50 个/高倍视野，肾功能正常。导致该病最可能的病原微生物是

- A. 厌氧菌
- B. 支原体
- C. 结核杆菌
- D. 革兰阴性球菌
- E. 革兰阴性杆菌

8. 女，60 岁。发热伴尿频、尿急 3 天。既往史无类似发作史。查体：T 38.2℃，左侧肾区有叩击痛，血常规：WBC  $12.5 \times 10^9/L$ ，N 0.85，血红蛋白 123g/L，血小板  $123 \times 10^9/L$ 。尿常规：蛋白微量，沉渣镜检红细胞 2~3 个/高倍视野，白细胞 40~50 个/高倍视野，肾功能正常。该患者抗感染治疗的疗程一般应为

- A. 3 天
- B. 1 周
- C. 2 周
- D. 4 周
- E. 8 周

9. 对鉴别上、下尿路感染最有意义的是

- A. 中段尿细菌培养阳性
- B. 尿路刺激症状
- C. 畏寒、发热、腰痛
- D. 肾小管浓缩功能正常
- E. 尿中白细胞管型

10. 男，35 岁。间断双下肢水肿 4 年，血压升高 2 年，加重 1 周。查体：BP：155/100mmHg，眼睑及双下肢轻度水肿，血常规：WBC  $6.5 \times 10^9/L$ ，N 0.62。血红蛋白 113g/L，血小板  $213 \times 10^9/L$ 。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 10~15 个高倍视野。肾功能正常。最可能的诊断是

- A. 高血压肾病
- B. 肾病综合征
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 急性肾小球肾炎

E. 慢性肾小球肾炎

11. 男，35 岁。间断水肿 3 年，加重 1 个月。查体：BP 150/80mmHg，双下肢中度凹陷水肿。尿常规：蛋白（+++），沉渣镜检红细胞 30~40 个/高倍视野。肾功能正常。下一步最应给予的处理是

- A. 利尿治疗
- B. 降压药物治疗
- C. 中成药治疗
- D. 糖皮质激素治疗
- E. 转至上级医院诊治

12. 男，34 岁。间断水肿 3 年，加重 1 个月。既往体健。查体：BP 145/95mmHg，双下肢中度凹陷性水肿。尿沉渣镜检红细胞 10~15/高倍视野，尿蛋白定量 2.8g/h 小时，血肌酐 169  $\mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是

- A. 肾病综合征
- B. 糖尿病肾病
- C. 高血压肾病
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 慢性肾小球肾炎

13. 男，55 岁。慢性肾小球肾炎 10 年，恶心、纳差 1 周。尿常规：蛋白（++），尿沉渣镜检红细胞 5~8/高倍视野。血肌酐明显升高。最可能出现的电解质紊乱是

- A. 高钾低钙血症
- B. 高钾低磷血症
- C. 低钾高钙血症
- D. 低钾低钙血症
- E. 低钾高磷血症

14. 女孩，7 岁，尿色红 3 天入院。患儿 10 天前曾患“急性扁桃体炎”。查体：BP 130/80mmHg，颜面、眼睑水肿，心肺无异常。尿常规：蛋白（+），尿沉渣镜检红细胞 30~40/高倍视野。血清 C3 下降。最可能的诊断是

- A. IgA 肾病
- B. 泌尿系结核
- C. 急性尿路感染
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 原发性肾病综合征

15. 前列腺增生症最早出现的症状是

- A. 尿频
- B. 排尿困难
- C. 血尿
- D. 尿痛
- E. 尿急

16. 男，40 岁。右腰部阵发性绞痛 3 天，右大腿内侧放射，查体：右腰部轻度压痛和叩击痛，腹肌紧张，尿沉渣镜检红细胞满视野。泌尿系 X 线平片示骨盆上体右侧直径 0.5cm 高密度影。最可能的诊断是

- A. 肾结石
- B. 膀胱结石
- C. 输尿管结石
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急性肾小球结石

17. 男，40 岁。右腰部阵发性绞痛 3 天，右大腿内侧放射，查体：右腰部轻度压痛和叩击痛，腹肌紧张，尿沉渣镜检红细胞满视野。泌尿系 X 线平片示骨盆上体右侧直径 0.5cm 高密度影。首选的治疗方案是

- A. 卧床休息
- B. 输尿管镜取石
- C. 开放性手术治疗
- D. 抗菌药物治疗
- E. 解痉治疗并大量饮水

18. 对异位妊娠患者，下列最有助于诊断的检查是

- A. 腹部触诊有明显的肌紧张
- B. 附件区可触及有触痛的包块
- C. 尿 HCG 阳性，后穹隆穿刺抽出不凝血
- D. 末梢血白细胞升高
- E. 血红蛋白降低

19. 女，40 岁。因阴道稀薄水样分泌物增多 1 周就诊。妇科检查见灰白色均质分泌物附着于阴道壁，可闻及鱼腥样臭味，擦去阴道分泌物，阴道黏膜无充血表现。最可能的诊断是

- A. 滴虫阴道炎
- B. 细菌性阴道物
- C. 萎缩性阴道炎
- D. 非特异性阴道炎
- E. 外阴阴道假丝酵母菌病

20. 女，40 岁。因阴道稀薄水样分泌物增多 1 周就诊。妇科检查见灰白色均质分泌物附着于阴道壁，可闻及鱼腥样臭味，擦去阴道分泌物，阴道黏膜无充血表现。首选的治疗药物是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 抗真菌药物
- D. 抗病毒药物
- E. 抗厌氧菌药物

21. 女，17 岁。经期腹痛 3 年，行经第 1~2 天疼痛最重，伴恶心、呕吐，口服布洛芬后好转，经后腹痛逐渐消失。最可能的诊断是

- A. 慢性盆腔炎

- B. 原发性痛经
- C. 子宫腺肌病
- D. 结核性盆腔炎
- E. 子宫内膜异位症

22. 女，21 岁。未婚，月经来潮 3 小时，下腹疼痛不能平卧 2 小时，呕吐 1 次。既往有类似情况，疼痛发生于月经期第一天，第二天自然缓解。盆腔超声检查：子宫及双侧附件未见明显异常。最可能的诊断是

- A. 异位妊娠
- B. 急性盆腔炎
- C. 原发性痛经
- D. 急性胃肠炎
- E. 输尿管结石

23. 女，25 岁。活动后心悸、乏力、头晕 3 个月。3 个月前自然分娩过程中曾有较大出血。现为哺乳期，平素偏食，血常规 WBC  $40 \times 10^9/L$ ，平均血细胞比容（MCV）低于正常，网织红细胞 1.6%，血小板  $130 \times 10^9/L$ 。最可能的诊断

- A. 溶血性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 慢性病性贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 再生障碍性贫血

24. 女，25 岁。活动后心悸、乏力、头晕 3 个月。3 个月前自然分娩过程中曾有较大出血。现为哺乳期，平素偏食，血常规 WBC  $40 \times 10^9/L$ ，平均血细胞比容（MCV）低于正常，网织红细胞 1.6%，血小板  $130 \times 10^9/L$ 。给予有效治疗 1 周时，外周血化验通常首先出现的变化是

- A. 网织红细胞增多
- B. 血小板计数增高
- C. 白细胞计数增高
- D. 血红蛋白浓度上升
- E. 中性粒细胞比例增高

25. 女，32 岁。因发现皮肤出血点和多处瘀斑，3 天就诊，既往体健，门诊化验：血红蛋白 118g/L，WBC  $4.5 \times 10^9/L$ ，血小板  $35 \times 10^9/L$ 。目前患者一般不常出现的临床表现是

- A. 鼻出血
- B. 牙龈出血
- C. 视物模糊
- D. 月经量增多
- E. 轻微损伤出血

26. 女，32 岁。因发现皮肤出血点和多处瘀斑，3 天就诊，既往体健，门诊化验：血红蛋白 118 g/L，WBC  $4.5 \times 10^9/L$ ，血小板  $35 \times 10^9/L$ 。目前不恰当的处理是

- A. 注意休息

- B. 避免外伤
- C. 复查血常规
- D. 忌用阿司匹林
- E. 血小板成分输液

27. 女，30 岁。心悸、烦躁、怕热伴腹泻及体重下降 3 个月。查体：心率 108 次/分，律齐，心音有力。空腹血糖 5.2mmol/L。最可能的诊断是

- A. 糖尿病
- B. 心肌炎
- C. 结肠癌
- D. 缺铁性贫血
- E. 甲状腺功能亢进症

28. 女，30 岁。心悸、烦躁、怕热伴腹泻及体重下降 3 个月。查体：心率 108 次/分，律齐，心音有力。空腹血糖 5.2mmol/L。为明确诊断，最重要的检查是

- A. 血常规
- B. 心电图
- C. 甲状腺功能
- D. 血清肿瘤标志物
- E. 口服葡萄糖耐量试验（OGTT）

29. 男，45 岁。2 年前因甲状腺功能亢进（甲亢）行放射性碘治疗，近半年来疲倦、纳差、嗓音粗低。查体：表情淡漠，面色苍白，心率 58 次/分，律齐，腿平软，肝脾肋下未触及，痛觉反键反射迟钝。最可能的诊断是

- A. 电解质紊乱
- B. 淡漠型甲亢
- C. 喉返神经麻痹
- D. 再生障碍性贫血
- E. 甲状腺功能减退症

30. 原发性甲状腺功能减退症的表现是

- A. FT<sub>3</sub> 正常，FT<sub>4</sub> 正常，TSH 正常
- B. FT<sub>3</sub> 正常，FT<sub>4</sub> 正常，TSH 减低
- C. FT<sub>3</sub> 减低，FT<sub>4</sub> 减低，TSH 降低
- D. FT<sub>3</sub> 减低，FT<sub>4</sub> 减低，TSH 增高
- E. FT<sub>3</sub> 正常，FT<sub>4</sub> 减低，TSH 增高

31. 女，70 岁。体检发现空腹血糖 7.2mmol/L，无明显自觉症状。有助于诊断为糖尿病的条件是

- A. 尿糖（+）
- B. 另 1 次空腹血糖 6.5 mmol/L
- C. 日常饮食，1 次餐后 2 小时血糖 9 mmol/L
- D. 日常饮食，1 次随机血糖超过 11.1 mmol/L
- E. 1 次口服葡萄糖耐量试验（OGTT）中餐后 2 小时血糖 10 mmol/L

32. 男，56 岁。体检发现血脂异常 1 个月来诊。无糖尿病、冠心病，脑卒中等病史。吸烟 20 年，约 20 支/天；饮酒 10 余年，约 2 两/天。体重指数 (BMI) 26。本次就诊 BP 130/80mmHg。血生化检验：血总胆固醇 (TC) 6.22mmol/L，低密度脂蛋白的 (LDL-C) 4.14mmol/L。目前进行的健康指导不恰当的是

- A. 戒烟限酒
- B. 减轻体重
- C. 有氧运动
- D. 服用保健品
- E. 低盐低脂饮食

33. 短暂性脑缺血发作，出现相应的症状及体征完全恢复的时间应在

- A. 24 小时内
- B. 28 小时内
- C. 36 小时内
- D. 48 小时内
- E. 72 小时内

34. 高血压脑出血的好发部位是

- A. 基底节
- B. 脑室
- C. 小脑
- D. 脑叶
- E. 脑干

35. 诊断癫痫的手段主要靠

- A. 头颅 CT
- B. 神经系统检查
- C. 脑脊液检查
- D. 病史
- E. 单纯根据脑电图检查结果

36. 男，21 岁。平时和同村邻居一同在外打工。半年前开始怀疑工友给他下毒，疑心被人跟踪，常自言自语。到乡卫生院就诊，躯体及神经系统检查未见异常。最可能的诊断是

- A. 抑郁症
- B. 焦虑障碍
- C. 精神分裂症
- D. 病毒性脑炎
- E. 分裂情感性精神病

37. 抑郁症最具特征性的睡眠障碍是

- A. 入睡困难
- B. 早醒
- C. 噩梦频繁

- D. 易醒  
E. 睡眠一觉醒节律紊乱

38. 女，60 岁。右侧颈肩部疼痛 2 年，可放射至右臂，间断右手麻木，查体：右肩活动良好。右侧臂丛牵拉试验 (+)。最可能的诊断是

- A. 肩周炎  
B. 腕管综合征  
C. 颈部肌肉劳损  
D. 类风湿关节炎  
E. 神经根型颈椎病

39. 女，60 岁。右侧颈肩部疼痛 2 年，可放射至右臂，间断右手麻木，查体：右肩活动良好。右侧臂丛牵拉试验 (+)。以下处理措施不恰当的是

- A. 影像学检查明确诊断  
B. 通过理疗或牵引缓解症状  
C. 长期口服止痛药物减轻症状  
D. 注意工作和睡眠时保持正确姿势  
E. 注意病情变化，必要时及时转诊

40. 女，70 岁。多发性关节疼痛 30 年。双侧腕关节肿痛、僵硬、强直、不能活动，双手手指向尺侧偏斜、关节呈梭形肿胀。活动受限。X 线片可见关节间隙狭窄、骨质破坏。最可能的诊断

- A. 类风湿关节炎  
B. 风湿性关节炎  
C. 退行性关节炎  
D. 结核性关节炎  
E. 痛风性关节炎

41. 女，70 岁。多发性关节疼痛 30 年。双侧腕关节肿痛、僵硬、强直、不能活动，双手手指向尺侧偏斜、关节呈梭形肿胀。活动受限。X 线片可见关节间隙狭窄、骨质破坏。最终导致该患者腕关节强直的原因是

- A. 关节半脱位  
B. 皮肤瘢痕挛缩  
C. 肌肉痉挛或挛缩  
D. 因疼痛而受限制  
E. 关节面上形成纤维性粘连

42. 骨关节炎的主要病变是

- A. 关节内化脓性感染  
B. 关节特异性炎症  
C. 关节软骨退变和继发性骨质增生  
D. 关节骨质疏松  
E. 骨与关节慢性疼痛



43. 房间隔缺损特征性的改变是
- A. 生长发育延迟、乏力、心悸
  - B. 心前区可听到粗糙收缩期杂音
  - C. 有肺动脉高压时，可出现青紫
  - D. 肺动脉瓣区第 2 心音亢进并固定分裂
  - E. X 线可见心房心室的扩大及肺门“舞蹈”

(44~45 题共用题干)

男婴，8 月龄。呕吐、腹泻 2 天，大便 12~14 次/日，水样便，尿量明显减少。查体：哭时泪少，眼窝及前囟明显凹陷。皮肤明显干燥，弹性差，四肢末梢稍凉。

44. 该患儿腹泻后的表现符合

- A. 无脱水
- B. 轻度脱水
- C. 中度脱水
- D. 重度脱水
- E. 极重度脱水

45. 根据患儿脱水程度，24 小时内补液总量应为

- A. 60~90ml/kg
- B. 90~120ml/kg
- C. 120~150ml/kg
- D. 150~180ml/kg
- E. 180~210ml/kg

46. 男童，12 岁。因眼睑水肿、尿少、尿呈洗肉水样、头晕 2 天就诊。3 周前患“化脓性扁桃体炎”。查体：BP 140/90mmHg，双下肢轻度非凹陷性水肿。尿常规：尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 30~40 个/高倍视野。血清 C3 下降，抗链球菌溶血素“O”(ASO) 升高。最可能的诊断是

- A. 紫癜性肾炎
- B. 急性尿路感染
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 原发性肾病综合征
- E. 慢性肾炎急性发作

47. 男童，12 岁。因眼睑水肿、尿少、尿呈洗肉水样、头晕 2 天就诊。3 周前患“化脓性扁桃体炎”。查体：BP 140/90mmHg，双下肢轻度非凹陷性水肿。尿常规：尿蛋白(++)，沉渣镜检红细胞 30~40 个/高倍视野。血清 C3，抗链球菌溶血素“O”(ASO) 升高。入院后经治疗，临床表现好转，可恢复体力活动的指标是

- A. 水肿消退
- B. 血压正常
- C. 血 ASO 正常
- D. 肉眼血尿消失
- E. 尿检完全正常

48. 女孩，7 岁，尿色红 3 天入院。患儿 10 天前曾患“急性扁桃体炎”。查体：BP 130/80mmHg，颜面、眼睑水肿，心肺无异常。尿常规：蛋白（+），尿沉渣镜检红细胞 30~40/高倍视野。血清 C3 下降。该患儿可以恢复体力活动的指标是

- A. 水肿消退
- B. 血压正常
- C. 血尿消失
- D. 尿蛋白消失
- E. 尿检完全正常

49. 维生素 D 缺乏性佝偻病活动早期的临床表现是

- A. 神经、精神症状
- B. 全身肌肉松弛
- C. 腕踝畸形
- D. 出牙延迟
- E. 颅骨软化

50. 男婴，出生后第 10 天。生后 3 天皮肤黄染，至今未退，足月顺产儿，纯母乳喂养，纳奶好，大小便正常。查体，全身皮肤黄染，余未见异常。血清总胆红素  $156 \mu\text{mol/L}$ ，间接胆红素  $130 \mu\text{mol/L}$ ，最可能的诊断是

- A. 新生儿肝炎
- B. 生理性黄疸
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿溶血病
- E. 新生儿胆管阻塞

51. 引起婴幼儿高热惊厥最常见的病因是

- A. 呼吸道感染
- B. 消化道感染
- C. 泌尿道感染
- D. 中毒性菌痢
- E. 破伤风

52. 女童，6 岁，发热、咽痛 2 天、皮疹 1 天，查体，T  $38^{\circ}\text{C}$ ，神志清，热病容，全身皮肤弥漫性充血、有密集针尖大小丘疹。颈部淋巴结肿大，咽充血，扁桃体二度肿大，表面可见黄色分泌物，杨梅舌，环口苍白圈阳性。实验室检查：WBC  $18 \times 10^9/\text{L}$ ，N 0.87，C 反应蛋白  $42\text{mg/L}$ 。最可能的诊断是

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 川崎病
- D. 猩红热
- E. 手足口病

53. 女童，6 岁，发热、咽痛 2 天、皮疹 1 天，查体，T  $38^{\circ}\text{C}$ ，神志清，热病容，全身皮肤弥漫性充血、有密集针尖大小丘疹。颈部淋巴结肿大，咽充血，扁桃体二度肿大，表面可见

黄色分泌物，杨梅舌，环口苍白圈阳性。实验室检查：WBC  $18 \times 10^9/L$ ，N 0.87，C 反应蛋白 42mg/L。首选的治疗药物是

- A. 青霉素
- B. 阿司匹林
- C. 利巴韦林
- D. 丙种球蛋白
- E. 醋酸泼尼松

54. 诊断病毒性肝炎最可靠的指标是

- A. 发病季节
- B. 起病方式
- C. 症状及体征
- D. 接触史
- E. 病原学及肝功能检查

55. 甲型肝炎病毒的主要传播途径是

- A. 消化道传播
- B. 输血传播
- C. 虫媒传播
- D. 呼吸道传播
- E. 直接接触传播

56. 流行性脑脊髓膜炎的主要临床特征是

- A. 急起高热、头痛、呕吐、昏迷、脑膜刺激征
- B. 急起高热、头痛、呕吐、昏迷、呼吸衰竭
- C. 急起高热、惊厥、呼吸衰竭
- D. 缓慢起病，发热不明显、头痛剧烈，无休克
- E. 急起高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点、瘀斑、脑膜刺激征

57. 男孩，9岁，学生。1月底因突起高热、剧烈头痛、恶心，伴非喷射性呕吐1次入院。查体：神清，全身皮肤散在瘀点、瘀斑，颈项抵抗，心率120次/分，两肺无异常，腹软无压痛。化验检查：血白细胞计数  $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.89，淋巴细胞 0.05，单核细胞 0.06。最可能的诊断是

- A. 伤寒
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 病毒性脑炎

58. 被狗咬伤后，首先的处理是

- A. 注射狂犬病免疫球蛋白
- B. 就地进行及时彻底的清创消毒
- C. 注射肾上腺素
- D. 迅速转诊

E. 抗生素治疗

59. 男，35 岁，近 1 年来反复出现发热，曾因反复不愈的“化脓性扁桃体炎”在多家医院就诊，此后仍经常发热，查体：T 38.4℃，P 110 次/分，R 31 次/分，BP 110/70mmHg。多部位可触及数个肿大的淋巴结。曾有婚外性生活史。应高度警惕的疾病是

- A. 艾滋病
- B. 肺部感染
- C. 淋巴结炎
- D. 化脓性扁桃体炎
- E. 先天性胸腺发育不全

60. 梅毒的病原体是

- A. 苍白密螺旋体
- B. 人类乳头瘤病毒
- C. 沙眼衣原体
- D. 解脲支原体
- E. 人免疫缺陷病毒

61. 男童，5 岁。反复右上腹部阵发性绞痛 2 天，并向右肩、背部放射。疼痛时面色苍白、坐卧不安、屈膝抱腹，辗转呻吟伴恶心、呕吐，间歇期无不适感。查体：腹软，上腹部深压痛，无肌紧张及反跳痛。最可能的诊断是

- A. 胆石病
- B. 急性胃炎
- C. 急性肠炎
- D. 胆道蛔虫病
- E. 急性胆囊炎

62. 男童，5 岁。反复右上腹部阵发性绞痛 2 天，并向右肩、背部放射。疼痛时面色苍白、坐卧不安、屈膝抱腹，辗转呻吟伴恶心、呕吐，间歇期无不适感。查体：腹软，上腹部深压痛，无肌紧张及反跳痛。为明确诊断，最有意义的检查是

- A. 血沉
- B. 血常规
- C. 粪隐血试验
- D. 胸 X 很平片
- E. 粪镜检找虫卵

63. 病毒性结膜炎除水样或浆液性结膜分泌物外，另外一个重要体征是

- A. 耳前淋巴结肿大
- B. 球结膜一定无水肿
- C. 结膜无充血
- D. 乳头增生上睑结膜比下睑结膜严重
- E. 结膜分泌物涂片以多形核白细胞占多数

64. 急性化脓性中耳炎常继发于

- A. 中耳胆脂瘤
- B. 鼻窦炎
- C. 结核
- D. 口腔溃疡
- E. 上呼吸道感染

65. 男，56 岁。刷牙或进食时牙龈反复出血伴牙齿松动 1 年。查体：牙龈暗红色伴肿胀增生，探之易出血，牙龈乳头萎缩，可见牙石附着，牙周袋形成。最可能的诊断

- A. 牙槽脓肿
- B. 慢性牙周炎
- C. 慢性根缘炎
- D. 侵袭性牙周炎
- E. 药物性牙龈增生

66. 关于体癣，下列说法错误的是

- A. 春夏季节多发
- B. 自觉瘙痒
- C. 皮损初起为大水疱
- D. 皮损边缘不断向外扩展为界限清楚的环状
- E. 肥胖多汗、糖尿病、慢性病及长期使用激素治疗者多见

67. 男，56 岁，5 天前田间工作时左手食指皮肤损伤，未处理。1 天前左手食指疼痛加剧，呈搏动性疼痛，伴明显肿胀，且有体温升高。最可能的诊断是

- A. 甲沟炎
- B. 指骨骨髓炎
- C. 脓性指头炎
- D. 化脓性滑膜炎
- E. 手部深间隙感染

68. 男，56 岁，5 天前田间工作时左手食指皮肤损伤，未处理。1 天前左手食指疼痛加剧，呈搏动性疼痛，伴明显肿胀，且有体温升高。当前适宜的治疗方法是

- A. 热敷
- B. 理疗
- C. 切开
- D. 敷药
- E. 碳指

69. 急性乳腺炎的病因不包括

- A. 乳头内陷
- B. 乳汁过多
- C. 乳管不通
- D. 乳房淋巴管阻塞
- E. 婴儿吸乳少

70. 男，35 岁。左侧腹股沟区肿块反复出现 10 年，除运动时稍有不便外，无其他特殊不适。平卧时肿块可以消失。3 小时前肿块突然增大，伴明显疼痛，恶心，未吐。最有可能的诊断是

- A. 睾丸肿瘤
- B. 腹股沟斜疝
- C. 皮下脂肪瘤
- D. 睾丸鞘膜积液
- E. 精索鞘膜积液

71. 男，35 岁。左侧腹股沟区肿块反复出现 10 年，除运动时稍有不便外，无其它特殊不适。平卧时肿块可以消失。3 小时前肿块突然增大，伴明显疼痛，恶心，未吐。该患者需转到上级医院治疗的主要原因是

- A. 体重减轻
- B. 担心恶变
- C. 可能嵌顿
- D. 肿块增大
- E. 再次发作

72. 内痔的早期症状是

- A. 排便时疼痛
- B. 内痔脱出
- C. 里急后重
- D. 肛门瘙痒
- E. 排便时出血

73. 注射破伤风抗毒素 (TAT) 的目的是

- A. 对易感人群进行预防接种
- B. 对可疑或确诊的破伤风患者进行紧急预防或治疗
- C. 杀灭伤口中繁殖的破伤风杆菌
- D. 主要用于儿童的预防接种
- E. 中和与神经细胞结合的毒素

74. 男，66 岁。因刺激性干咳 3 个月、痰中带血 1 个月就诊，无发热、胸痛、自服抗菌药、止咳药效果不佳。既往史有烟史 40 年，每天约 25 支。最可能的诊断是

- A. 肺炎
- B. 肺癌
- C. 肺结核
- D. 肺栓塞
- E. 支气管炎

75. 男，66 岁。因刺激性干咳 3 个月、痰中带血 1 个月就诊，无发热、胸痛、自服抗菌药、止咳药效果不佳。既往史有烟史 40 年，每天约 25 支。为明确诊断，首选的检查是

- A. 血常规
- B. 痰培养

C. 心电图

D. 胸部 CT

E. 超声心动图

76. 男，66 岁。因刺激性干咳 3 个月、痰中带血 1 个月就诊，无发热、胸痛、自服抗菌药、止咳药效果不佳。既往史有烟史 40 年，每天约 25 支。对该患者最恰当的处理是

A. 吸氧

B. 抗结核治疗

C. 静脉使用抗菌药物

D. 尽快转诊到上级医院诊治

E. 加强止咳、化痰药物治疗

77. 怀疑胃癌者的首选诊断方法是

A. X 线钡餐

B. 胃镜检查

C. B 超

D. CT

E. 磁共振

78. 男，56 岁。2 个月来反复出现黄便表面附着鲜血，1~3 次/日，有排便不尽感，无发热。近 1 周感乏力。发病以来体重减轻约 3kg。查体：BP 90/55mmHg，心肺查体无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未及，未及包块，肠鸣音 3 次/分。实验室检查：WBC  $5.6 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 90g/L，血小板  $200 \times 10^9/L$ 。血常规：红细胞 20~30 个/低倍视野，未见白细胞，粪隐试验 (+)。最可能的诊断是

A. 痔

B. 直肠癌

C. 肠结核

D. 克罗恩病

E. 细菌性痢疾

79. 男，56 岁。2 个月来反复出现黄便表面附着鲜血，1~3 次/日，有排便不尽感，无发热。近 1 周感乏力。发病以来体重减轻约 3kg。查体：BP 90/55mmHg，心肺查体无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未及，未及包块，肠鸣音 3 次/分。实验室检查：WBC  $5.6 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 90g/L，血小板  $200 \times 10^9/L$ 。血常规：红细胞 20~30 个/低倍视野，未见白细胞，粪隐试验 (+)。最简便的检查方法是

A. 直肠指检

B. 粪培养

C. 结肠镜检查

D. 血肿瘤标志物

E. 粪便查抗酸杆菌

80. 子宫颈癌的确诊依据是

A. 阴道双合诊检查

B. 宫颈刮片细胞学检查

- C. 碘试验
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈和颈管组织学检查

81. 关于合理用药的描述，错误的是

- A. 药品能不用就不用
- B. 药品能少用就不多用
- C. 药品能口服就不肌注
- D. 药品能肌注就不输液
- E. 保健食品能替代药品

82. 女，70岁。高血压病史20年，糖尿病病史5年。长期服用依那普利（5mg，bid）、非洛地平缓释片（5mg；qd）、辛伐他汀（20mg，qd）、二甲双胍（0.25，tid）、阿卡波糖（50mg，tid），血压和血糖控制良好。近日患者出现全身肌肉酸痛、无力症状。最可能引起不良反应的药物

- A. 依那普利
- B. 非洛地平
- C. 辛伐他汀
- D. 二甲双胍
- E. 阿卡波糖

83. 童，4岁。因发热、咳嗽、咳痰2天就诊。查体：T 38.5℃。该患儿不宜选的抗菌药物是

- A. 红霉素
- B. 头孢氨苄
- C. 阿莫西林
- D. 克林霉素
- E. 左氧氟沙星

84. 女，25岁。因发热、寒战、头痛2天就诊，体温最高39.8℃。现妊娠4个月。该患者首选的退热药物是

- A. 布洛芬
- B. 吲哚美辛
- C. 塞来昔布
- D. 阿司匹林
- E. 对乙酰氨基酚

85. 男，40岁。发热、咳嗽、咳痰伴右侧胸痛2天到乡卫生院就诊。曾按“感冒”治疗，体温未下降。3小时前出现高热、寒战、肢冷、尿少。查体：T 39℃，P 120次/分，R 28次/分，BP 88/70mmHg，口唇发绀，右肺可闻及大量湿啰音。最可能的并发症是

- A. 心肌炎
- B. 胸膜炎
- C. 呼吸衰竭
- D. 心力衰竭



E. 感染性休克

86. 男，40 岁。发热、咳嗽、咳痰伴右侧胸痛 2 天到乡卫生院就诊。曾按“感冒”治疗，体温未下降。3 小时前出现高热、寒战、肢冷、尿少。查体：T 39℃，P 120 次/分，R 28 次/分，BP 88/70mmHg，口唇发绀，右肺可闻及大量湿啰音。正确的救治措施是

- A. 抗感染治疗
- B. 使用呼吸兴奋剂
- C. 使用正性肌力药
- D. 使用糖皮质激素
- E. 积极补液并转诊至上级医院

87. 男，24 岁。因右下肺炎来院诊治。患者无青霉素过敏史，青霉素皮试阴性，给予青霉素 400 万，0.9%氯化钠注射液 100ml，静脉滴注。滴注 2 分钟后患者出现头晕、面色苍白、呼吸困难、出冷汗等症状，立即停药。该患者首选的抢救药物是

- A. 多巴胺
- B. 异丙嗪
- C. 地塞米松
- D. 肾上腺素
- E. 去甲肾上腺素

88. 男，24 岁。因右下肺炎来院诊治。患者无青霉素过敏史，青霉素皮试阴性，给予青霉素 400 万，0.9%氯化钠注射液 100ml，静脉滴注。滴注 2 分钟后患者出现头晕、面色苍白、呼吸困难、出冷汗等症状，立即停药。上述抢救药物的最佳给药途径是

- A. 口服
- B. 肌肉注射
- C. 皮下注射
- D. 静脉泵入
- E. 气管内吸入

(89~90 题共用题干)

男，17 岁。打篮球时突感右胸部闷痛、气促 1 小时。查体：T 36.8℃，P 85 次/分，R 22 次/分，BP 125/75mmHg。右肺触觉语颤减弱，叩诊呈鼓音，呼吸音减弱；左肺叩诊呈清音，呼吸音增强；双肺均未闻及干湿啰音。心律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。

89. 最可能的诊断是

- A. 肺大疱
- B. 支气管哮喘
- C. 急性肺栓塞
- D. 自发性气胸
- E. 急性心肌梗死

90. 为明确诊断应进行的检查是

- A. 心电图
- B. 胸部 X 线片
- C. 超声心动图

D. 动脉血气分析

E. 心肌坏死标志物

91. 男，28 岁。体育锻炼时突然右侧胸痛，胸闷，伴呼吸困难，干咳，查体：右侧触觉语颤消失，右肺叩诊呈鼓音。最可能的诊断是

A. 自发性气胸

B. 急性肺栓塞

C. 急性心肌炎

D. 急性支气管炎

E. 结核性胸膜炎

92. 胸外心脏按压正确的部位是

A. 心前区

B. 胸骨下半部

C. 胸骨中上 1/3 交界处

D. 胸骨中部

E. 胸骨角

93. 高血压性脑出血急性期最威胁病人生命的是

A. 出血后血肿形成

B. 出血后并发脑水肿

C. 出血后并发脑疝

D. 昏迷后肺感染

E. 昏迷后电解质紊乱

94. 在糖尿病酮症酸中毒的治疗中，最关键的措施是

A. 补充液体

B. 小剂量胰岛素治疗

C. 纠正酸中毒

D. 补钾

E. 处理诱因

95. 女，25 岁。体型偏胖，近期为控制体重刻意节食。上午 11 时突然出现全身乏力、心慌、恶心、出汗、晕厥。既往体健。最可能的诊断是

A. 体位性低血压

B. 阿-斯综合征

C. 单纯性晕厥

D. 低血糖症

E. 重度贫血

96. 男，82 岁。晚饭前已经服用磺脲类降糖药，晚饭后又误服该降糖药。末次服药 1 小时后出现出汗、恶心、饥饿感、焦虑、心悸，随即出现神志不清被送诊。既往有糖尿病病史 30 年，平时口服降糖药控制血糖。有缺血性脑血管病病史 10 年。可迅速确定病因检查是

A. 血糖

- B. 血常规
- C. 尿常规
- D. 粪常规
- E. 心肌酶谱

97. 男，82 岁。晚饭前已经服用磺脲类降糖药，晚饭后又误服该降糖药。末次服药 1 小时后出现出汗、恶心、饥饿感、焦虑、心悸，随即出现神志不清被送诊。既往有糖尿病病史 30 年，平时口服降糖药控制血糖。有缺血性脑血管病病史 10 年。可迅速确定病因检查是最恰当的急救处理是

- A. 持续吸氧
- B. 急诊溶栓治疗
- C. 输注红细胞悬液
- D.  $H_2$ 受体拮抗剂静脉注射
- E. 50%葡萄糖 60ml 静脉注射

98. 男，17 岁。被硬物击中头部后意识丧失，约 10 分钟后清醒，轻微头痛，不能回忆受伤时情形，无恶心、呕吐，无视物模糊等症状。最可能的诊断是

- A. 脑震荡
- B. 颅内血肿
- C. 脑挫裂伤
- D. 硬膜外血肿
- E. 短暂性脑缺血发作

99. 女，70 岁。头痛、左侧肢体无力伴呕 2 小时，呼之不应 1 小时来乡卫生院就诊。查体 BP 184/100mmHg，昏迷，左侧鼻唇沟变浅，左侧 Babinski 征阳性。医生决定紧急处理后转至上级医院诊治。紧急处理措施中最重要的是

- A. 活血化瘀
- B. 脱水降颅压
- C. 静脉补充营养
- D. 给予血管扩张剂
- E. 抗菌药物预防感染

100. 女，70 岁。头痛、左侧肢体无力伴呕 2 小时，呼之不应 1 小时来乡卫生院就诊。查体 BP 184/100mmHg，昏迷，左侧鼻唇沟变浅，左侧 Babinski 征阳性。医生决定紧急处理后转至上级医院诊治。该患者转至上级医院后，首选的辅助检查是

- A. 脑电图检查
- B. 脑脊液检查
- C. 头颅 CT 检查
- D. 全脑血管造影术
- E. 经颅多普勒超声检查

101. 女，51 岁。半小时前因房屋倒塌砸伤下腹部，诉骨盆区及下腹部疼痛。查体：神志清楚，双上肢运动可，双下肢运动障碍。考虑患者有骨盆骨折的可能。现场急救时首先要注意的情况是

- A. 生命体征
- B. 合并下肢骨折
- C. 合并神经损伤
- D. 合并血管损伤
- E. 腹部脏器损伤

102. 男，29 岁。车祸后左上腹疼痛半小时入院，查体：T 36℃，P 120 次/分，BP 90/60mmHg。面色苍白，出冷汗，腹部移动性浊音可疑阳性，为明确诊断最有价值的检查是

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 消化道内镜
- D. 腹部 X 线平片
- E. 诊断性腹部穿刺

103. 女，85 岁。3 小时前行走时不慎摔倒，右髌部疼痛，活动时加重。查体：右下肢短缩，外旋畸形约 50°，右髌叩击痛，活动障碍。最可能的诊断是

- A. 骨盆骨折
- B. 胫骨骨折
- C. 腓骨骨折
- D. 髌关节脱位
- E. 股骨颈骨折

104. 女，85 岁。3 小时前行走时不慎摔倒，右髌部疼痛，活动时加重。查体：右下肢短缩，外旋畸形约 50°，右髌叩击痛，活动障碍。最适宜的治疗是

- A. 尽快转往上级医院治疗
- B. 局部理疗，适度推拿按摩
- C. 对症止痛，扶助行器适度下床活动
- D. 卧床休息 2 个月，患足穿丁字鞋防旋转
- E. 皮牵引 2 个月，坚持股四头肌收缩训练

105. 女，40 岁。摔倒后右肘部疼痛 1 小时。查体：右肘畸形，前臂变短，尺骨鹰嘴后突，肘关节于半屈曲位不能活动。最可能的诊断是

- A. 前臂性折
- B. 肘关节后脱位
- C. 肱骨踝上骨折
- D. 胫骨鹰嘴骨折
- E. 肘部软组织损伤

(106~107 题共用题干)

女，51 岁。与家人吵架后吞服百草枯 10ml，2 小时后出现头晕、头痛、咳嗽、胸闷、呼吸困难、发绀，吞咽时胸骨后烧灼感伴恶心、呕吐胃内容物、腹痛、尿少。

106. 最严重的损伤是

- A. 急性肾损伤
- B. 急性肺损伤

- C. 急性肝损伤
- D. 急性右心衰竭
- E. 接触部位溃疡

107. 正确的治疗措施是

- A. 后期给予糖皮质激素
- B. 洗胃后尽快转院进行血液净化治疗
- C. 用碳酸氢钠溶液洗胃，并加用抗菌药物
- D. 尽快用高锰酸钾溶液洗胃，直到无色无味
- E. 洗胃后连续服用 15%白陶土悬液 2~3 天

108. 某家庭 4 人在门窗紧闭的室内围着炭火烤炉吃火锅后不久，均出现头痛、头晕、乏力等症状，随后口唇呈樱桃红色，多汗、意识模糊。最可能的原因是

- A. 砷中毒
- B. 硫化氢中毒
- C. 二氧化碳中毒
- D. 一氧化碳中毒
- E. 亚硝酸盐中毒

109. 苯二氮草类药物中毒的常用拮抗剂是

- A. 氟马西尼
- B. 纳洛酮
- C. 药用炭
- D. 卡马西平
- E. 阿普唑仑

110. 男，45 岁，夏季连续在阳光下做农活 4 小时后出现头晕、轻微头痛，口渴、咽干、出汗、心悸，既往无慢性病史。查体：T 37.5℃，P 86 次/分。R 22 次/分。BP 110/70mmHg，心率 86 次/分，律齐。现场首选的处理措施是

- A. 4℃冰水灌肠
- B. 快速静脉输液
- C. 氯丙嗪静脉滴注
- D. 全身放入 4℃冰水中浸泡
- E. 转移到通风阴凉处，脱去衣服

111. 男，35 岁。3 小时前从 10 米高空坠落，左侧肢体着地。查体：神志尚清楚，左上臂有明显划伤，可见搏动性出血，左胸部、腹部触痛明显。现场救治措施不恰当的是

- A. 立即拨打急救电话
- B. 立即开通静脉通道输液
- C. 立即将患者抱离受伤现场
- D. 立即左侧上臂加压包扎止血
- E. 现场伤情验证，明确大致受伤情况