

护士执业资格考试：《答疑周刊》2022 年第 5 期

1. 用于诊治子宫内膜异位症患者的方法是

A. 宫腔镜

B. 腹腔镜

C. 剖腹探查

D. 阴道后穹窿穿刺

E. 腹腔穿刺

【正确答案】B

【学员提问】不是后穹窿穿刺吗？

【解析】子宫内膜异位症的辅助检查：

1. 超声波检查 了解异位囊肿的位置、大小和形状。

2. 血清癌抗原 125 (CA125) 值测定 【医学教育网原创】主要用于监测疗效和复发。

3. 腹腔镜检查 是诊断子宫内膜异位症最佳方法。

2. 【问题】肺部正常叩诊音有哪些？

【解答】肺部正常叩诊音：①清音：是正常肺部叩诊音。正常成人前胸自肺尖至第 5~6 肋间隙为肺清音区（左侧第 3~4 肋间隙近心脏处叩诊音稍浊），背部两侧从肩胛上区到第 9~11 肋下缘皆为清音。②浊音：为肺部与实质性脏器（心、肝）相重叠部分的叩诊音。【医学教育网原创】右前胸第 5~6 肋间隙以下为肝浊音区。③鼓音：左前胸第 5、6 肋间隙以下为胃泡鼓音区。

3. 【问题】口腔常用漱口液有哪些？都在什么情况下用？

【解答】

(1) 0.9%氯化钠溶液：清洁口腔，预防感染。口腔 pH 为中性时适用。

(2) 朵贝尔溶液（复方硼酸溶液）：轻微抑菌，消除口臭。口腔 pH 为中性时适用。

(3) 0.02%呋喃西林溶液：【医学教育网原创】清洁口腔，有广谱抗菌作用。口腔 pH 为中性时适用。

(4) 1%~3%过氧化氢溶液：遇有机物时放出新生氧，有抗菌、防臭作用。口腔 pH 偏酸性时适用。

(5) 1%~4%碳酸氢钠溶液：属碱性药剂，用于真菌感染。口腔 pH 偏酸性时适用。

(6) 2%~3%硼酸溶液：属酸性防腐剂，可改变细菌的酸碱平衡，起抑菌作用。口腔 PH 偏碱性时适用。

(7) 0.1%醋酸溶液：用于铜绿假单胞菌感染时。口腔 pH 偏碱性时适用。

4. 【问题】什么是前负荷，后负荷，怎么区分啊？

【解答】前负荷是指心肌收缩之前所遇到的阻力或负荷，即在舒张末期，心室所承受的容量负荷或压力就是前负荷，实际上是心室舒张末期容量或心室舒张末期室壁张力的反应。【医学教育网原创】与静脉回心血量有关。与之对应的是后负荷（心肌收缩之后所遇到的阻力或负荷）。

心脏负荷过重

1) 容量负荷（前负荷）过重：见于二尖瓣、主动脉瓣关闭不全；房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭；以及伴有全身血容量增多疾病，如甲状腺功能亢进症、慢性贫血等。

2) 压力负荷（后负荷）过重：【医学教育网原创】见于高血压、主动脉瓣狭窄、肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄等，以及左、右心室收缩期射血阻力增加的疾病。