

医学教育网主管护师：《答疑周刊》2022 年第 29 期

问题索引：

- 1.【问题】肺结核化疗方案？
- 2.【问题】目标监测定义及内容？
- 3.【问题】家系图原则？
- 4.【问题】等渗溶液、高渗溶液、低渗溶液分别有哪些？
- 5.【问题】中心静脉压与补液的关系？

具体解答：

1.【问题】肺结核化疗方案？

【解答】(1) 标准疗法：一般用于无明显症状的原发型肺结核，疗程 9~12 个月。

(2) 两阶段疗法：用于活动性原发型肺结核、急性粟粒型结核病及结核性脑膜炎。分强化治疗阶段和巩固治疗阶段，[医学教育网原创]强化治疗阶段需联合使用 3~4 种杀菌药物，目的在于迅速杀灭敏感菌及生长繁殖活跃的细菌与代谢低下的细菌，防止或减少耐药菌株的产生，此为化疗的关键时期。此阶段一般需 3~

2.【问题】目标监测定义及内容？

【解答】

定义	全面综合性监测的基础上，针对高危人群、高发感染部位等开展的医院感染及其危险因素的监测
监测内容	1.省（市）级以上医院及其他有条[医学教育网原创]件的医院每年开展 1~2 项目标性监测
	2.监测目标应包括手术部位感染监测、成人及儿童重症监护病房（ICU）医院感染监测、新生儿病房医院感染监测及细菌耐药物监测
	3.县级以上医院和床位数≥300 张的其他医院，[医学教育网原创]应对医院感染病原体分布及其抗感染药物的耐药性进行监测
	4.每项目标监测持续时间应连续 6 个月以上
	5.应定期对目标监测资料进行分析、反馈，对其效果进行评价及提出改进措施；年终应有总结报告；监测结束，应有终结报告

3.【问题】家系图原则？

【解答】家系图的排列原则是以长[医学教育网原创]辈在上，子辈在下；同辈中，长者在左，幼者在右。

4.【问题】等渗溶液、高渗溶液、低渗溶液分别有哪些？

【解答】(1) 与血浆渗透压相等的溶液称等渗溶液。如 5%的葡萄糖溶液或 0.9%的氯化钠溶液。

(2) 比血浆渗透压低的溶液称低渗溶液[医学教育网原创]。如蒸馏水等。

(3) 比血浆渗透压高的溶液称高渗溶液。如 10%的葡萄糖液或 50%葡萄糖液等。

5.【问题】中心静脉压与补液的关系？

【解答】

CVP	BP	原因	处理原则
低	低	血容量严重不足	充分补液
低	正常	血容量不足	适当补液
高	低	心功能不全或血容量相对过多 [医学教育网原创]	给强心药，纠正酸中毒，舒张血管
高	正常	容量血管过度收缩	舒张血管
正常	低	心功能不全或血容量不足	补液试验