

医学教育网全科主治医师考试:《答疑周刊》2022年第37期

临床检验标本采集是我们临床常用的一些血、尿、便、痰的标本采集,内容相对来说简单一些,但仍然需要好好掌握。

问题索引:

1. 痢疾患者粪便常规检查应取哪种标本?
2. 脑卒中偏瘫功能恢复机制最主要依赖于什么?
3. 动脉采血的注意事项有哪些?

具体解答:

1. 痢疾患者粪便常规检查应取哪种标本?

痢疾患者粪便常规检查应取以下哪项标本

- A. 黏液
- B. 血液
- C. 脓血黏液处的粪便
- D. 脓液
- E. 无脓液的粪便

【答案】C

【解析】对于痢疾患者,粪便常规检查应用竹签自粪便多处取材,特别是有脓、血、黏液等异常部分。[医学教育网原创]

2. 痰液标本采集注意事项有哪些?

以下关于痰液标本采集叙述正确的是

- A. 做细胞学检查,以上午9~10时留痰最好
- B. 做细胞学检查,以清晨第一口痰最好
- C. 观察痰液分层情况,可用少量甲醛防腐
- D. 如不能及时送检,冷藏情况下可放置3天
- E. 观察痰液分层情况,可用少量甲苯防腐

【答案】A

【解析】因痰液在呼吸道停留时间太长,细胞可发生自溶或变性而结构不清,因此做细胞学检查以上午9~10时留痰最好[医学教育网原创];观察痰液分层情

况, 可用少量石炭酸防腐; 如不能及时送检, 可冷藏, 但不宜超过 24 小时。

3. 动脉采血的注意事项有哪些?

动脉采血说法正确的是

- A. 多在股静脉穿刺采血
- B. 采血后不必立即送检
- C. 不必与空气隔离
- D. 常在肱动脉处采血
- E. 采集时间不超过 15 分钟

【答案】E

【解析】动脉采血多在股动脉穿刺采血, 也可用肱动脉或桡动脉采血。采得的血标本必须与空气隔离, 立即送检。[医学教育网原创]采集时间不超过 15 分钟, 2~8℃冷藏或冰水浴中送检不超过 30 分钟。