

2022 年妇产科主治医师必备考点 (81-90)

【考点 81】阴道流血

胎盘胎膜残留、蜕膜残留引起的阴道流血多在产后 10 日发生。

【考点 82】滴虫性阴道炎的传染途径

滴虫性阴道炎可经性交直接传染。

【考点 83】外阴道假丝酵母菌病

外阴道假丝酵母菌病临床表现为外阴瘙痒、灼痛、尿痛及性交痛。白带增多，典型的白带呈白色稠厚豆渣样。检查时小阴唇内侧及阴道黏膜上附件有白色膜状物，擦后露出红肿黏膜面。严重者见皮肤皲裂。

【考点 84】细菌性阴道病的诊断条件

下列 4 条中有 3 条阳性者即可诊断为细菌性阴道病。其中 (4) 条必备。

(1) 阴道分泌物为均质稀薄白带。

(2) 阴道 pH > 4.5 (正常阴道 pH ≤ 4.5)，是厌氧菌所致。

(3) 胺臭味实验阳性：取阴道分泌物少许放玻璃片上，加入 10% 氢氧化钾液 1~2 滴，产生一种烂鱼肉样腥气味即为阳性。

(4) 线索细胞阳性：取少许白带放在玻片上，加一滴生理盐水混合，置于高倍显微镜下见到线索细胞。线索细胞即阴道脱落的表层细胞，于细胞边缘贴附大量颗粒状物即为加德纳尔菌等，使细胞边缘不清。

【考点 85】LSIL

LSIL：鳞状上皮基底及副基底样细胞增生，细胞核极性轻度紊乱，有轻度异型性，核分裂象少，局限于上皮下 1/3 层，P16 染色阴性或在上皮内散在点状阳性。

HSIL：细胞核极性紊乱，核浆比例增加，核分裂象增多，异型细胞扩展到上皮下 2/3 层甚至全层，P16 在上皮 > 2/3 层面内呈弥漫连续阳性。

【考点 86】宫颈癌的转移途径

宫颈癌的转移途径主要为直接蔓延及淋巴转移，血行转移极少见。

【考点 87】宫颈病变的试验

醋酸白和碘试验肉眼检查正常宫颈鳞状上皮含丰富糖原，碘溶液涂染后呈棕色或深褐色，不能染色说明该处上皮缺乏糖原，存在炎性或有宫颈病变。在无条件时，也可用醋

酸白和碘试验进行肉眼筛查，如有异常，在碘不染色区取材活检，可提高诊断率。或再进行阴道镜检查下活检。

【考点 88】阴道流血

阴道流血是子宫内膜癌最常见的症状，可发生在任何年龄妇女。可表现为不规则阴道流血；绝经后持续或间歇性流血；未绝经者则为经量增多、经期延长。

【考点 89】颗粒细胞瘤

颗粒细胞瘤：为低度恶性肿瘤。能分泌雌激素，故有女性化作用。青春期前可出现假性性早熟，生育年龄患者出现月经紊乱，绝经后患者则有不规则阴道流血，常合并子宫内膜增生，甚至发生子宫内膜腺癌。肿瘤多为单侧，呈分叶状，表面光滑，实性或部分囊性，切面组织脆而软，伴出血坏死灶。镜下见颗粒细胞环绕成小圆形囊腔，中心含嗜伊红物质及核碎片。

【考点 90】卵巢囊肿蒂扭转

卵巢囊肿蒂扭转为常见的妇科急腹症。好发于瘤蒂长、中等大、活动度良好的肿瘤。其典型症状为一侧下腹剧痛，常伴恶心，呕吐。妇科检查肿物张力较大，有压痛，以瘤蒂部最明显。有时不全扭转可自然复位，腹痛随之缓解。蒂扭转一经确诊，应尽快行腹腔探查术。

