

医学教育网口腔执业医师：《答疑周刊》2022 年第 39 期

- 问题索引：1. 牙周疾病的二级预防是？
2. 口腔癌的警告标志是？
3. 孕妇用药的原则是？

具体解答

1. 牙周疾病的二级预防是？

属于牙周疾病二级预防概念

- A. 专业性洁治
- B. 刷牙
- C. 修整不良修复体
- D. 恢复缺失牙
- E. 纠正不良习惯

【答案】A

【解析】牙周病的二级预防旨在早期发现、早期诊断、早期治疗，减轻已发生的牙周病的严重程度，控制其发展。对[医学教育网]局限于牙龈的病变，及时采取洁治，去除菌斑和牙石，控制其进一步发展。二级预防的效果是在一级预防基础上取得的，其远期效果与患者是否能长期坚持各种预防措施有关。

2. 口腔癌的警告标志是？

下列不是口腔癌警告标志的是

- A. 2 周以上尚未愈合的口腔溃疡
- B. 口腔黏膜有白色、红色和发暗的斑
- C. 口腔与颈部有不正常的肿胀和淋巴结肿大
- D. 口腔反复出血，出血原因不明
- E. 第三磨牙周围反反复复的炎症

【答案】E

【解析】口腔癌警告标志：①口腔内有 2 周以上尚未愈合的溃疡；②口腔黏膜有

白色、红色和发暗的斑；③口腔与颈部有不明[医学教育网]原因的肿胀和淋巴结肿大；④口腔内有不明原因的反复出血；⑤面部、口腔、咽部和颈部有不明原因的麻木与疼痛。

3. 孕妇用药的原则是？

关于孕妇用药的原则中不正确的是

- A. 提倡联合用药
- B. 限制用药时间
- C. 限制用药剂量
- D. 不使用安眠类药物
- E. 不使用镇静药物

【答案】A

【解析】孕妇用药的原则是：能用一种药物就避免联合用药，应严格限制用药时间和药物剂量。妊娠初期，应防止风疹之[医学教育网]类的病毒感染，不使用镇静、安眠类药物，防止可能造成的唇裂或腭裂等畸形的发生。妊娠期嗜好烟酒将增加胎儿畸形危险。同时，应减少咖啡因的摄入量。