

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2023年第5期

问题索引:

1. 【问题】尿液异常颜色对应什么病?
2. 【问题】如何推算预产期?
3. 【问题】室性心动过速和室上性心动过速的区别?

具体解答:

1. 【问题】尿液异常颜色对应什么病?

【解答】(1) 血尿: 红色或棕色, 尿中含大量红细胞时呈洗肉水色。见于急性肾小球肾炎, 输尿管结石, 泌尿系统肿瘤、结核及感染等。

(2) 血红蛋白尿: 浓红茶色或酱油色, 隐血试验呈阳性。见于血型不合输血后的溶血、恶性疟疾及阵发性睡眠性血红蛋白尿等。

(3) 胆红素尿: 深黄色或黄褐色。见于阻塞性黄疸及肝细胞性黄疸。

(4) 乳糜尿: 乳白色。见于丝虫病。

(5) 脓尿: 白色混浊。见于泌尿系统感染。

2. 【问题】如何推算预产期?

【解答】 $EDC(月) = LMP(月) - 3(或+9)$ $EDC(日) = LMP(日) + 7$

末次月经日期的月份加9或减3, 为预产期月份数; 天数加7, 为预产期日。

如:

末次月经 4 月 25, 故预产期:

月: $4+9=13$, 为来年的 1 月份

日: $25+7=32$,

故预产期为来年的 2 月 1 日。

此类型题注意年份和 2 月份天数。

3. 【问题】室性心动过速和室上性心动过速的区别?

【解答】

据异位起搏点的部位不同, 可分为房性、房室交界区性和室性心动过速。由

于房性与房室交界区性阵发性心动过速在临床上难以区别,故统称为室上性心动过速,简称室上速。

分类	表现	特点
室上速	室上性心动过速可发生在无明显器质性心脏病的病人,也可见于风心病、冠心病、甲状腺功能亢进、慢性肺部疾病、洋地黄中毒等病人	突然发作、突然终止,可持续数秒、数小时甚至数日,发作时病人可感心悸、头晕、胸闷、心绞痛,甚至发生心力衰竭、休克。症状轻重取决于发作时的心率及持续时间。听诊心室率可达 150~250 次 / 分,大多心律绝对规则,心尖部第一心音强度恒定
室性心动过速 简称室速	室性心动过速多见于各种器质性心脏病的病人,最常见于冠心病的急性心肌梗死病人,其他如心肌病、心力衰竭、心脏瓣膜病、电解质紊乱等,亦有个别发生于无器质性心脏病者	发作时的临床症状轻重可因发作时心室率、发作持续时间、基础心脏病变病人的心功能状况而各异