

医学教育网口腔执业医师: 《答疑周刊》2023 年第 28 期

- 问题索引: 1. 拔牙的禁忌证为?
2. 下颌第三磨牙阻生分类的方法为?
3. 干槽症临床表现为?

具体解答

1. 拔牙的禁忌证为?

下列属于拔牙的适应证的是

- A. 一年前发生过心肌梗死
- B. 急性肝炎
- C. 月经期
- D. 近期心绞痛频繁发作
- E. 心脏病合并高血压

【答案】A

【解析】心脏病: 下列情况应视[医学教育网]为拔牙的禁忌证: ①6个月内发生过心肌梗死; ②近期心绞痛频繁发作; ③心功能III~IV级; ④三度或二度II型房室传导阻滞; ⑤心脏病合并高血压。

2. 下颌第三磨牙阻生分类的方法为?

下列不属于下颌第三磨牙阻生分类方法的是

- A. 根据牙与下颌升支及第二磨牙的关系
- B. 根据牙在骨内的深度
- C. 根据牙龈覆盖阻生齿的程度
- D. 根据阻生第三磨牙的长轴与第二磨牙的长轴关系
- E. 可根据牙在正常牙列中线的位置

【答案】C

【解析】下颌阻生牙(第三磨牙)的临床分类: 根据牙与下颌升支及第二磨牙的关系、根据牙在骨内的深度、根据阻生[医学教育网]第三磨牙的长轴与第二磨牙

的长轴关系, 此外, 还可根据牙在正常牙列中线的位置分为颊侧移位、舌侧移位及正中位三种。对于一个阻生的下颌第三磨牙的正确诊断描述, 应包括以上各项。

3. 干槽症临床表现为?

不属于干槽症临床表现的是

- A. 可分为腐败型与非腐败型
- B. 持续性疼痛, 可向耳颞部放射
- C. 拔牙窝空虚
- D. 腐败型较为严重而多见
- E. 骨壁触痛不明显

【答案】E

【解析】干槽症临床上可分为腐败型与非腐败型两类, 前者更严重而多见。主要症状发生在术后 2~3 天后的持续性疼痛, 可向耳颞部放射。检查时, 腐败型者可见拔牙窝空虚, 牙槽骨壁表面有灰白[医学教育网]色假膜覆盖, 创内有腐败坏死物质, 有明显臭味; 骨壁有明显触痛, 创口周围牙龈略红肿; 局部淋巴结可有肿大, 压痛。偶有发生张口受限、低热、全身不适等症状。