

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2024年第22期

问题索引:

1. 【问题】免疫系统各个疾病的总结。
2. 【问题】新生儿体重的分级?
3. 【问题】胃溃疡与十二指肠溃疡的区别?

具体解答:

1. 【问题】免疫系统各个疾病的总结。

【解答】

	风湿热	类风湿关节炎	系统性红斑狼疮	幼年特发性关节炎	过敏性紫癜
病因	A组乙型溶血性链球菌	可疑病原体感染	自身免疫性疾病	自身免疫性疾病	自身免疫反应
典型表现	发热	晨僵 关节疼痛、肿胀最早出现		慢性关节滑膜炎	皮肤紫癜
关节炎表现	侵犯大关节	腕、掌指、大关节对称持续	对称	小关节发展到大关节呈游走性	
护理	保暖、避免潮湿、受寒	每日清晨进行温水浴	禁忌日光浴、碱性肥皂		
治疗	青霉素	阿司匹林	糖皮质激素	非甾体类抗炎药: 萘普生	肾上腺皮质激素

2. 【问题】新生儿体重的分级?

【解答】(1) 正常体重儿: 出生体重 $\geq 2500\text{g}$ 并 $\leq 4000\text{g}$ 的新生儿。

(2) 低出生体重儿: 出生体重 $< 2500\text{g}$ 的新生儿。其中出生体重 $< 1500\text{g}$ 称极低出生体重儿; 出生体重 $< 1000\text{g}$ 称超低出生体重儿。

(3) 巨大儿: 出生体重 $>4000\text{g}$ 的新生儿。

3. 【问题】胃溃疡与十二指肠溃疡的区别?

【解答】

项目	胃溃疡	十二指肠溃疡
疼痛性质	烧灼或痉挛感	钝痛、灼痛、胀痛或剧痛, 或仅有饥饿样不适感
疼痛部位	剑突下正中或稍偏左	上腹正中或稍偏右
疼痛发作时间	进食后 30~60 分钟, 疼痛较少发生于夜晚	进食后 1~3 小时, 也常发生在午夜至凌晨
胃酸分泌	正常或降低	增多
疼痛持续时间	1~2 小时	饭后 2~4 小时, 到下次进餐后为止
一般规律	进食—疼痛—缓解	疼痛—进食—缓解