

精选考点+例题

知识点 1:

肝硬化的病因很多,我国以病毒性肝炎最为常见,国外则以酒精中毒居多。

【例题】我国肝硬化最常见的原因是

- A. 病毒性肝炎
- B. 酒精中毒
- C. 胆汁淤积
- D. 工业毒物
- E. 循环障碍

【正确答案】A

【答案解析】肝硬化是由于一种或多种致病因素长期或反复作用于肝脏,造成肝细胞坏死、肝组织弥漫性纤维化、假小叶和再生结节形成为特征的慢性肝病。以门静脉高压和肝功能损害为主要临床表现。晚期可出现上消化道出血、肝性脑病、继发感染等严重并发症。引起肝硬化的病因很多,我国以病毒性肝炎最为常见,国外则以乙醇中毒居多。

知识点 2:

超声心动图检查为明确和量化诊断二尖瓣狭窄的最可靠方法。

【例题】明确和量化诊断二尖瓣狭窄的最可靠的方法是

- A. X线平片
- B. 心电图
- C. 超声心动图
- D. 心血管造影
- E. C反应蛋白

【正确答案】C

【答案解析】超声心动图检查为明确和量化诊断二尖瓣狭窄的最可靠方法。

知识点 3:

慢性失血是成人缺铁性贫血最重要、最多见的原因。

【例题】成人女性缺铁性贫血常见的原因是

- A. 铁摄入量不足
- B. 铁吸收不良
- C. 月经过多
- D. 钩虫病
- E. 痔疮出血

【正确答案】C

【答案解析】慢性失血是成人缺铁性贫血最重要、最多见的原因。反复小量失血可使体内贮存铁逐渐耗竭，如消化性溃疡出血、月经过多、肠息肉、肠道癌肿、钩虫病、痔疮出血等。成人女性缺铁性贫血常见的原因是月经过多。

知识点 4:

传染病基本特征：病原体、传染性、流行性、免疫性。

【例题】不属于传染病的基本特征的是

- A. 病原体
- B. 传染性
- C. 流行性
- D. 免疫性
- E. 自限性

【正确答案】E

【答案解析】传染病与其他疾病的主要区别在于其具有下列基本特征：

(1) 病原体，每种传染病都是由特异性病原体引起的，临床上检出病原体对诊断具有重要意义。

(2) 传染性，这是传染病与其他感染性疾病的主要区别。

(3) 流行病学的特征，包括：①流行性：在一定条件下，传染病能在人群中广泛传播蔓延的特性称为流行性，按其强度可分为散发、流行、大流行、暴发；②地方性：受地理气候等自然因素影响，某些传染病局限在一定地区内发生，称为地方性传染病；③季节性：某些传染病在每年一定季节出现发病率升高现象。

(4) 免疫性，人体感染病原体后，均能产生针对病原体及其产物（如毒素）的

特异性免疫。

知识点 5:

肺心病发生的先决条件: 肺动脉高压形成。

【例题】慢性肺源性心脏病的发病机制主要是

- A. 肺泡毛细血管损伤
- B. 肺弥散功能障碍
- C. 支气管阻塞
- D. 支气管肺组织感染
- E. 肺动脉高压形成

【正确答案】E

【答案解析】慢性肺源性心脏病的发病机制主要有肺动脉高压的形成、右心室肥大和右心功能不全。其中, 肺动脉高压形成是肺源性心脏病发生的先决条件。

知识点 6:

一氧化碳轻度中毒时血液碳氧血红蛋白浓度为 10%~20%, 中度中毒时血液碳氧血红蛋白浓度为 30%~40%, 重度中毒时为 50%以上。

【例题】重度一氧化碳中毒, 血液中碳氧血红蛋白浓度为

- A. 10%~20%
- B. 20%~30%
- C. 30%~40%
- D. 40%~50%
- E. 50%以上

【正确答案】E

【答案解析】重度一氧化碳中毒时病人出现深昏迷、抽搐、呼吸困难、面色苍白、四肢湿冷、全身大汗、血压下降。最后因脑水肿, 呼吸、循环衰竭而死亡。血液 HbCO 浓度可高于 50%。

知识点 7:

法洛四联症 X 线检查: 心影呈“靴型”。

【例题】法洛四联症 X 线检查可见

- A. 肺动脉段突出
- B. 心影呈“靴形”
- C. 肺门血管影增粗
- D. 肺纹理增多
- E. 透光度减弱

【正确答案】B

【答案解析】法洛四联症 X 线检查可见心影呈“靴形”。

知识点 8:

继发性渐进性痛经是子宫内膜异位症典型症状。

【例题】子宫内膜异位症患者痛经的特点是

- A. 痛经发生于月经前期
- B. 痛经开始于月经前, 经期加重, 经后缓解
- C. 痛经与月经周期无关
- D. 痛经经期轻微, 经后加重
- E. 痛经多为原发性痛经

【正确答案】B

【答案解析】子宫内膜异位症患者疼痛的特点是痛经, 继发性渐进性痛经是其典型症状。常于月经前 1~2 天始, 经期第 1 天最剧, 以后逐渐减轻, 至经后数日。

随着时间的推移, 痛经往往进行性加重。

知识点 9:

破伤风起始表现: 咀嚼不便、张口困难。

【例题】破伤风的初发症状是

- A. 苦笑
- B. 颈项强直
- C. 角弓反张

- D. 张口困难
- E. 手足抽搐

【正确答案】D

【答案解析】破伤风杆菌产生的痉挛毒素入血后，最初受影响的肌群是咀嚼肌，造成张口困难和咀嚼不便，随后出现牙关紧闭，其后才影响面部肌肉产生苦笑面容，影响颈项肌产生颈项强直，影响四肢畸形成角弓反张。

知识点 10:

急性胰腺炎典型症状：转移性右下腹疼痛。

【例题】急性阑尾炎典型的症状为

- A. 右下腹痛
- B. 右下腹痛并伴有轻度胃肠功能紊乱
- C. 腹膜刺激征
- D. 右下腹固定性压痛性包块
- E. 转移性右下腹痛

【正确答案】E

【答案解析】根据临床经验，急性阑尾炎典型的症状是转移性右下腹痛，少数病例开始即出现右下腹痛，伴有轻度胃肠功能紊乱，故选项 A、B、C 不对，选项 D 右下腹固定性压痛为急性阑尾炎最重要的体征，但只有在阑尾周围形成脓肿后才能触及固定性压痛包块，故 D 不对。因此答案选 E。

知识点 11:

子宫颈癌早期表现：接触性出血。

【例题】子宫颈癌的早期症状是

- A. 腹部包块
- B. 绝经后出血
- C. 接触性出血
- D. 阴道排液
- E. 腹痛

【正确答案】C

【答案解析】宫颈癌阴道流血：早期表现为接触性出血，可见性交后或妇科检查后出血。

知识点 12:

甲状腺术后一侧喉返神经损伤：引起声音嘶哑。两侧喉返神经损伤：导致两侧声带麻痹，引起失声、呼吸困难，甚至窒息。

【例题】单侧喉返神经损伤的表现是

- A. 呛咳
- B. 声音嘶哑
- C. 发声音调变低
- D. 手足抽搐
- E. 烦躁、谵妄

【正确答案】B

【答案解析】喉返神经含支配声带的运动神经纤维，一侧喉返神经损伤，大都引起声嘶，术后虽可由健侧声带代偿性地向患侧过度内收而恢复发音，但喉镜检查显示患侧声带依然不能内收，因此不能恢复其原有的音色。双侧喉返神经损伤，视其损伤全支、前支抑或后支等不同的平面，可导致失音或严重的呼吸困难，甚至窒息，需立即作气管切开。

知识点 13:

反映小儿营养状况的敏感指标：体重。

【例题】最能反映小儿营养状况的指标是

- A. 身长
- B. 头围
- C. 体重
- D. 胸围
- E. 皮下脂肪

【正确答案】C

【答案解析】体重为各器官、组织和体液的总重量，是小儿营养状况的重要指标（最易取得的敏感指标，也是临床计算给药量、输液量的依据）。

知识点 14:

疼痛常是关节受累的首发症状，也是风湿病病人就诊的主要原因。

【例题】风湿病患者就诊的主要原因是

- A. 关节疼痛
- B. 活动受限
- C. 关节僵硬
- D. 皮肤水肿
- E. 皮疹

【正确答案】A

【答案解析】疼痛常是关节受累最常见的首发症状，也是风湿病患者就诊的主要原因。

知识点 15:

高钾血症是肾衰少尿或无尿期最主要和最危险的并发症，也是引起病人死亡的最常见原因。

【例题】急性肾衰竭少尿或无尿期引起患者死亡的最常见原因是

- A. 水中毒
- B. 代谢性酸中毒
- C. 尿毒症
- D. 高钾血症
- E. 低钙血症

【正确答案】D

【答案解析】由于尿排钾减少，而组织代谢产钾，引起高钾血症，高钾血症主要抑制心肌细胞，致严重的心律失常、心室颤动或心搏骤停，是主要死因之一。

知识点 16:

异位妊娠最常见：输卵管妊娠。

【例题】异位妊娠最常见的部位是

- A. 输卵管
- B. 肠系膜
- C. 大网膜
- D. 卵巢
- E. 宫颈

【正确答案】A

【答案解析】异位妊娠最常见的部位是输卵管，常由于输卵管管腔或周围的炎症，引起管腔通畅不佳，阻碍孕卵正常运行，使之在输卵管内停留着床发育，导致输卵管妊娠流产或破裂。

知识点 17:

小儿惊厥首选药物：地西洋。

【例题】控制小儿惊厥的首选药物是

- A. 苯巴比妥钠
- B. 地西洋
- C. 卡马西平
- D. 苯妥英钠
- E. 10%水合氯醛

【正确答案】B

【答案解析】地西洋（安定）为控制惊厥发作首选药物。一般 1~2 分钟起效，但维持时间短暂，必要时 30 分钟后重复给药一次。

知识点 18:

血栓闭塞性脉管炎早期主要症状：间歇性跛行。

【例题】血栓闭塞性脉管炎的早期症状主要是

- A. 小腿和足部酸痛
- B. 游走性静脉炎

- C. 患肢萎缩
- D. 静息痛
- E. 间歇性跛行

【正确答案】 E

【答案解析】 血栓闭塞性脉管炎按病变发展程度，临床上可分为三期：局部缺血期、营养障碍期、组织坏死期。局部缺血期以血管痉挛为主，表现为患肢苍白、肢端发凉、怕冷、小腿酸胀乏力，足趾有麻木感。尤其在行走一定距离后出现小腿肌肉抽痛，被迫停下，休息后疼痛可缓解，但再行走后又可发作，这种现象称为间歇性跛行。

知识点 19:

产后出血指胎儿娩出后 24 小时内，阴道分娩者出血量 $\geq 500\text{ml}$ ，剖宫产者 $\geq 1000\text{ml}$ 。

【例题】 产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内，阴道出血超过

- A. 400ml
- B. 500ml
- C. 700ml
- D. 800ml
- E. 1000ml

【正确答案】 B

【答案解析】 胎儿娩出后 24 小时内出血量超过 500ml 者为产后出血。

知识点 20:

绒毛膜癌最常见的转移部位依次为肺、阴道、脑及肝。

【例题】 绒毛膜癌最常见的转移部位是

- A. 阴道
- B. 脑
- C. 肝
- D. 肾

E. 肺

【正确答案】E

【答案解析】绒毛膜癌简称绒癌，是一种高度恶性的滋养细胞肿瘤。早期就可以通过血液转移至全身各个组织器官，引起出血坏死。最常见的转移部位依次为肺、阴道、脑及肝等。

知识点 21:

婴儿肠套叠的特征：黏液果酱样血便。

【例题】小儿肠套叠大便的特点是

- A. 脓血便
- B. 黏液便
- C. 果酱样血便
- D. 柏油样便
- E. 白陶土便

【正确答案】C

【答案解析】小儿肠套叠早期大便呈果酱样血便，白陶土便见于阻塞性黄疸，柏油样便见于上消化道出血。

知识点 22:

食管癌首选治疗方法：手术治疗。

【例题】食管癌首选治疗方法

- A. 手术治疗
- B. 放疗
- C. 化疗
- D. 中医中药
- E. 免疫治疗

【正确答案】A

【答案解析】食管癌以手术治疗为主，辅以放射、化学药物等综合治疗。

知识点 23:

前囟为顶骨和额骨边缘形成的菱形间隙, 其对边中点连线长度在出生时约 1.5~2.0cm, 后随颅骨发育而增大, 6 个月后逐渐骨化而变小, 1~1.5 岁时闭合。

【例题】小儿前囟闭合的时间为

- A. 出生后 6~8 周
- B. 出生后 3~4 个月
- C. 1~1.5 岁
- D. 2 岁
- E. 2~2.5 岁

【正确答案】C

【答案解析】前囟为顶骨和额骨边缘形成的菱形间隙, 其对边中点连线长度在出生时 1.5~2.0cm, 后随颅骨发育而增大, 6 个月后逐渐骨化而变小, 1~1.5 岁时闭合, 最迟不超过 2 岁。

知识点 24:

肠结核最常见的好发部位: 回肠部。

【例题】肠结核最常见的好发部位是

- A. 回肠部
- B. 升结肠
- C. 横结肠
- D. 降结肠
- E. 乙状结肠

【正确答案】A

【答案解析】肠结核主要由人型结核分枝杆菌引起, 主要发生在回盲部, 可能与下列因素有关: 含有结核分枝杆菌的肠内容物在回盲部停留的时间较长, 且回盲部淋巴组织丰富, 结核分枝杆菌又容易侵犯淋巴组织。其他肠段也可受累, 依次为升结肠、空肠、横结肠、降结肠、阑尾、十二指肠和乙状结肠, 少数见于直肠。

知识点 25:

滴虫性阴道炎的典型特征：分泌物呈稀薄泡沫状。

【例题】滴虫阴道炎的典型白带表现为

- A. 稠厚豆渣样
- B. 稀薄泡沫状
- C. 浓稠干酪样
- D. 脓血样
- E. 洗肉水样

【正确答案】B

【答案解析】白色或黄色泡沫状白带是滴虫性阴道炎的典型特征；凝乳状或豆腐渣样白带是念珠菌阴道炎的特征；稀薄淡黄色或血性白带是老年性阴道炎的典型特征。

知识点 26:

确诊肾结核的主要依据：尿液检查。

【例题】确诊肾结核的主要依据是

- A. 尿液中反复查出结核杆菌
- B. 膀胱镜见到充血水肿
- C. 有肾外结核病灶
- D. 腹部平片可见肾区有不透明光阴影
- E. 尿液中查出脓细胞

【正确答案】A

【答案解析】连续三次进行清晨尿液结核杆菌检查，若结果为阳性对诊断肾结核有决定性意义。

知识点 27:

原发性肝癌最常见的首发症状：肝区疼痛。

【例题】原发性肝癌最常见的早期表现是

- A. 肝区持续性疼痛
- B. 肝脏进行性肿大

- C. 进行性黄疸
- D. 腹水
- E. 上消化道出血

【正确答案】A

【答案解析】肝区疼痛是原发性肝癌最常见和最主要的症状，约半数以上病人以此为首发症状，多呈间歇性或持续性钝痛或刺痛。

知识点 28:

病毒性心肌炎常见的病原体：柯萨奇病毒。

【例题】病毒性心肌炎最常见的病原体是

- A. 埃可病毒
- B. 流感病毒
- C. 轮状病毒
- D. 柯萨奇病毒
- E. 腺病毒

【正确答案】D

【答案解析】能引起心肌炎的病原体，主要是病毒，现已知病毒有 20 余种，常见的有柯萨奇病毒、埃可病毒、脊髓灰质炎病毒、腺病毒、流感病毒等。

知识点 29:

特发性血小板减少性紫癜首选药物：糖皮质激素。

【例题】治疗慢性特发性血小板减少性紫癜首选的措施是

- A. 使用糖皮质激素
- B. 行脾脏切除手术
- C. 应用细胞毒类免疫抑制剂
- D. 应用大剂量丙种球蛋白
- E. 应用长春新碱

【正确答案】A

【答案解析】肾上腺糖皮质激素为治疗慢性特发性血小板减少性紫癜的首选药，

该类药物可以抑制血小板与抗体结合，阻止单核-巨噬细胞吞噬破杯血小板（主要是在脾、肝），并降低血管壁通透性。

知识点 30:

肾病综合征最常见的并发症及引起死亡的原因：感染。

【例题】肾病综合征最常见的并发症是

- A. 感染
- B. 急性肾衰竭
- C. 高血压
- D. 低血容量性休克
- E. 血栓形成

【正确答案】A

【答案解析】感染是肾病综合征最常见的并发症，与蛋白质营养不良、免疫功能紊乱及激素治疗有关。

知识点 31:

血清离子钙降低是引起惊厥、喉痉挛、手足抽搐的直接原因。

【例题】维生素 D 缺乏性手足搐搦症的直接原因是

- A. 血磷明显降低
- B. 维生素 D 缺乏
- C. 碱性磷酸酶增高
- D. 血清离子钙降低
- E. 钙磷乘积降低

【正确答案】D

【答案解析】维生素 D 缺乏性手足搐搦症的直接原因是血清离子钙降低。

知识点 32:

新生儿肺透明膜病病因：缺乏肺泡表面活性物质。

【例题】新生儿肺透明膜病的病因是

- A. 肺泡发育不成熟
- B. 缺少肺泡上皮细胞
- C. 肺泡张力过高
- D. 代谢性酸中毒
- E. 缺少肺泡表面活性物质

【正确答案】 E

【答案解析】 新生儿肺透明膜病的病因是缺少肺泡表面活性物质。

知识点 33:

惊厥发作持续超过 30 分钟或 2 次发作间歇期意识不能恢复者称惊厥持续状态。

【例题】 惊厥持续状态是指

- A. 惊厥持续时间超过 1 小时
- B. 抽搐间期有清醒期
- C. 惊厥持续时间超过 30 分钟，间歇期有清醒期
- D. 抽搐超过 1 小时，间歇期无清醒期
- E. 抽搐超过 30 分钟，间歇期无清醒期

【正确答案】 E

【答案解析】 惊厥持续状态是指惊厥持续 30 分钟以上，或两次发作间歇期意识不能完全恢复。

知识点 34:

颈椎病最常见类型：神经根型颈椎病。

【例题】 颈椎病最常见的类型

- A. 神经根型
- B. 脊髓型
- C. 椎动脉型
- D. 交感型
- E. 混合型

【正确答案】 A

【答案解析】颈椎病分为神经根型、脊髓型、椎动脉型和交感神经型，神经根型最常见，占颈椎病 50%~60%。

知识点 35:

肠梗阻共同的症状：腹痛、腹胀、呕吐、停止排便排气。

【例题】肠梗阻的典型临床表现为

- A. 腹痛、腹胀、呕血、黑便、肠鸣音亢进
- B. 腹痛、腹胀、呕吐、停止肛门排便排气
- C. 腹痛、腹胀、呕吐、胃型、肠鸣音亢进
- D. 腹痛、腹胀、腹泻、低热、肠鸣音消失
- E. 腹痛、腹胀、食欲减退、体重下降、腹内包块

【正确答案】B

【答案解析】尽管肠梗阻的原因、部位、病变程度、发病急慢不同，临床表现也不尽相同，但其共同特点为肠内容物不能顺利通过肠道，从而导致腹痛、腹胀、呕吐、停止肛门排便、排气，故选 B。

知识点 36:

甲状腺大部切除术后最危急的并发症：术后呼吸困难和窒息。

【例题】甲状腺大部切除术后最危急的并发症是

- A. 饮水呛咳
- B. 声音嘶哑
- C. 手足抽搐
- D. 甲状腺危象
- E. 呼吸困难和窒息

【正确答案】E

【答案解析】甲状腺大部分切除术后最危急的并发症是呼吸困难和窒息，多发生于术后 48 小时内。

知识点 37:

宫颈癌普查：宫颈刮片细胞学检查。

【例题】筛查早期宫颈癌最常用的方法是

- A. 碘实验
- B. 阴道镜检查
- C. 宫腔镜检查
- D. 宫颈刮片细胞学检查
- E. 宫颈活体组织检查

【正确答案】D

【答案解析】宫颈刮片细胞学检查常用于宫颈癌筛查。

知识点 38：

洋地黄中毒最重要的表现是各类心律失常，最常见者为室性期前收缩。

【例题】洋地黄类药物中毒最重要的临床表现是

- A. 室早二联律
- B. 出现奔马律
- C. 黄视、绿视
- D. 恶心、呕吐
- E. 头痛

【正确答案】A

【答案解析】洋地黄类药物中毒最重要的临床表现是各类心律失常，最常见者为室性期前收缩，多呈二联律。

知识点 39：

食管癌表现：早期为吞咽哽噎感；中晚期为进行性吞咽困难。

【例题】食管癌进展期主要的临床表现是

- A. 进行性吞咽困难
- B. 进行性消瘦
- C. 进食后呕吐
- D. 进食后胸骨后疼痛

R. 进食后呛咳

【正确答案】A

【答案解析】食管癌进展期主要的临床表现是进行性吞咽困难。

知识点 40:

头痛、呕吐和视乳头水肿三项是颅内压增高的典型表现。

【例题】颅内压增高“三主征”是

- A. 偏瘫、偏盲、抽搐
- B. 头疼、呕吐、视乳头水肿
- C. 头疼、抽搐、偏瘫
- D. 偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍
- E. 头痛、呕吐、偏瘫

【正确答案】B

【答案解析】颅内压增高“三主征”即头疼、呕吐、视乳头水肿。

知识点 41:

流行性乙型脑炎主要传染源：猪。主要传播途径：蚊虫叮咬。

【例题】流行性乙型脑炎的主要传播媒介是

- A. 苍蝇
- B. 蚊子
- C. 老鼠
- D. 蟑螂
- E. 猪

【正确答案】B

【答案解析】流行性乙型脑炎主要通过蚊虫叮咬而传播；蚊感染后 10~12 日能传播乙脑病毒，并可经卵传代越冬，是乙脑病毒的长期储存宿主。

知识点 42:

心脏骤停的最常见的病因：心脏病（以冠心病最多见）。

【例题】引起心脏骤停的最常见的病因是

- A. 先天性心脏病
- B. 风湿性心脏病
- C. 冠心病
- D. 心肌炎
- E. 心肌病

【正确答案】C

【答案解析】心脏骤停的病因包括心脏病（以冠心病最多见）、严重的电解质紊乱和酸碱平衡失调、意外事件、药物中毒或过敏、某些治疗、手术或麻醉意外。

知识点 43:

甲胎蛋白（AFP）是早期诊断肝癌的最特异性的肿瘤标记物。

【例题】对诊断原发性肝癌具有较高特异性的检查是

- A. 放射性核素肝扫描
- B. B 超
- C. 选择性肝动脉造影术
- D. CT
- E. 血清甲胎蛋白测定

【正确答案】E

【答案解析】早期诊断肝癌的最特异性的肿瘤标记物是甲胎蛋白。

知识点 44:

支气管扩张症是支气管慢性异常扩张的疾病。由于支气管及其周围肺组织的慢性炎症和阻塞，导致支气管管腔扩张和变形的慢性支气管化脓性疾病。

【例题】引起支气管扩张的主要原因是

- A. 先天性发育缺陷
- B. 支气管-肺组织的感染和支气管阻塞
- C. 支气管外部纤维的牵拉
- D. 遗传因素

E. 过敏体质

【正确答案】B

【答案解析】支气管扩张症是支气管慢性异常扩张的疾病。由于支气管及其周围肺组织的慢性炎症和阻塞,导致支气管管腔扩张和变形的慢性支气管化脓性疾病。

知识点 45:

猩红热皮疹多在发热后第 2 天出现;始于耳后、颈部及上胸部,24 小时左右迅速波及全身。皮疹约 48 小时达高峰,然后体温下降、皮疹按出疹顺序 2~4 日内消失。

【例题】猩红热的皮疹出现于

- A. 发热前
- B. 发热同时出疹
- C. 发热后 24 小时内
- D. 发热后 48 小时
- E. 发热后 48~72 小时

【正确答案】D

【答案解析】多在发热后第 2 天出现;始于耳后、颈部及上胸部,24 小时左右迅速波及全身。皮疹特点为弥漫性充血的皮肤上出现分布均匀的针尖大小的丘疹,压之褪色,触之有砂纸感,疹间无正常皮肤,伴有痒感。皮疹约 48 小时达高峰,然后体温下降、皮疹按出疹顺序 2~4 日内消失。

知识点 46:

良性前列腺增生的临床表现包括:尿频(夜尿次数增多);进行性排尿困难;尿潴留;无痛血尿。

【例题】良性前列腺增生的临床表现不包括

- A. 进行性排尿困难
- B. 夜尿次数增多
- C. 无痛血尿
- D. 尿潴留

E. 尿急

【正确答案】 E

【答案解析】 良性前列腺增生的临床表现包括：尿频，尤其是夜尿次数增多；进行性排尿困难；尿潴留；无痛血尿。

知识点 47:

乳腺癌癌肿侵及 Cooper 韧带，可使其缩短而致癌肿表面皮肤凹陷，呈“酒窝征”。

【例题】 乳腺癌患者乳房的“酒窝征”是由于

- A. 淋巴管堵塞
- B. 静脉堵塞
- C. 乳管堵塞
- D. Cooper 韧带受侵
- E. 动脉堵塞

【正确答案】 D

【答案解析】 随着肿瘤增大，可引起乳房局部隆起。若累及 Cooper 韧带，可使其缩短而致肿瘤表面皮肤凹陷，即所谓“酒窝征”。

知识点 48:

消化性溃疡的主要病因：幽门螺杆菌感染。

【例题】 引起消化溃疡最常见的致病菌是

- A. 幽门螺杆菌
- B. 大肠杆菌
- C. 痢疾杆菌
- D. 沙门杆菌
- E. 嗜盐杆菌

【正确答案】 A

【答案解析】 引起消化性溃疡最常见的致病菌是幽门螺杆菌。

知识点 49:

破伤风治疗的重要环节：控制并解除痉挛。

【例题】破伤风治疗最重要的环节是

- A. 镇静、解痉
- B. 局部创口处理
- C. 注射破伤风抗毒素
- D. 全身支持疗法
- E. 病室安静，减少刺激

【正确答案】A

【答案解析】破伤风治疗最重要的是镇静、解痉。

知识点 50：

上尿路结石主要表现是与活动有关的疼痛和血尿。

【例题】属于肾结石主要症状的是

- A. 疼痛，放射至大腿外侧
- B. 高血压
- C. 膀胱刺激症状
- D. 贫血
- E. 与活动有关的血尿

【正确答案】E

【答案解析】上尿路结石（肾结石、输尿管结石）主要表现是与活动有关的疼痛和血尿。

知识点 51：

系统性红斑狼疮具典型的特征性皮疹有：①蝶形红斑；②盘状红斑；③血管炎性皮肤病；④手指末和甲周红斑，有助于本病的诊断。

【例题】系统性红斑狼疮（SLE）典型的皮肤是

- A. 盘形红斑
- B. 蝶形红斑
- C. 斑丘疹

- D. 紫斑
- E. 荨麻疹

【正确答案】 B

【答案解析】 蝶形红斑是系统性红斑狼疮（SLE）的典型表现。

知识点 52:

宫颈和宫颈管活组织检查：确定宫颈癌前病变和宫颈癌的最可靠方法。

【例题】 确认宫颈癌的可靠方法是

- A. 阴道镜检查
- B. 宫颈刮片细胞学检查
- C. 宫颈和宫颈管活检
- D. 诊断性刮宫
- E. 阴道脱落细胞学检查

【正确答案】 C

【答案解析】 宫颈刮片细胞学检查常用于早期宫颈癌普查。阴道镜检查有利于进一步观察早期病变，选择病变部位进行宫颈活组织检查，以提高诊断正确率。宫颈和宫颈管活组织检查是确定宫颈癌前病变和宫颈癌的最可靠方法。

知识点 53:

维生素 D 缺乏性手足搐搦症主要死亡原因：喉痉挛。

【例题】 婴儿手足搐搦症主要死亡原因是

- A. 心力衰竭
- B. 脑水肿
- C. 喉痉挛
- D. 呼吸衰竭
- E. 手足搐搦

【正确答案】 C

【答案解析】 喉痉挛主要见于婴儿。表现为喉部肌肉、声门突发痉挛，出现呼吸困难，吸气时喉鸣。严重者可发生窒息而死亡。

知识点 54:

侵蚀性葡萄胎阴道转移灶表现为紫蓝色结节，破溃后大量出血。

【例题】侵蚀性葡萄胎妇科检查可见

- A. 卵巢黄素囊肿
- B. 阴道壁囊肿
- C. 宫颈菜花样改变
- D. 阴道紫蓝色结节
- E. 卵巢黄体囊肿

【正确答案】D

【答案解析】侵蚀性葡萄胎易血行播散，常见部位有肺、阴道转移，转移至阴道可形成阴道紫蓝色结节。

知识点 55:

慢性阻塞性肺气肿最常见的病因：慢性支气管炎。

【例题】慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A. 支气管扩张
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 尘肺
- E. 肺纤维化

【正确答案】B

【答案解析】支气管慢性炎症引起管腔狭窄，不完全阻塞，且慢性炎症破坏小支气管壁软骨，失去支气管正常的支架作用，吸气时气体尚能进入肺泡，呼气时因胸膜腔内压增加、支气管过度缩小、陷闭而气体排出困难，肺泡内大量气体积聚，压力升高，肺泡明显膨胀。

知识点 56:

脑血栓早期溶栓的首选药物：尿激酶。

【例题】脑血栓早期溶栓的首选药物是

- A. 肝素
- B. 尿激酶
- C. 华法林
- D. 阿司匹林
- E. 双嘧达莫

【正确答案】B

【答案解析】目前脑血栓溶栓药物主要为尿激酶，发病到溶栓6小时内最有效。

知识点 57:

胆道疾病首选的检查：超声检查。安全、快速、简便、经济而准确。

【例题】胆道疾病首选的检查是

- A. B超
- B. 腹部平片
- C. 经皮肝穿刺胆管造影
- D. 胆道镜
- E. 内镜逆行胰胆管造影

【正确答案】A

【答案解析】胆道疾病常用的超声检查方法有B超和超声内镜检查。B超是诊断胆道疾病的首选方法，该方法无创、简单、可重复、经济且准确率高。

知识点 58:

肝性脑病：晚期肝硬化的最严重并发症，也是最常见的死亡原因。

【例题】肝硬化患者最严重的并发症是

- A. 上消化道出血
- B. 感染
- C. 肝性脑病
- D. 原发性肝癌
- E. 功能性肾衰竭

【正确答案】C

【答案解析】肝硬化最严重的并发症是肝性脑病,它是引起患者死亡的主要原因。

知识点 59:

子宫内膜癌典型症状:绝经后出现阴道流血。

【例题】某患者绝经6年,近来有阴道少量流血,刮宫时发现:刮出物为沉渣样组织,可能的诊断为

- A. 宫颈癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 子宫肌瘤
- D. 附件囊肿
- E. 老年性阴道炎

【正确答案】B

【答案解析】子宫内膜癌好发于老年妇女,病变位于子宫内膜,绝经后出血是其典型表现。

知识点 60:

硬脑膜外血肿典型的意识障碍是伤后昏迷有“中间清醒期”。

【例题】硬脑膜外血肿的典型意识改变是

- A. 嗜睡
- B. 谵妄
- C. 昏迷不超过30分钟
- D. 有中间清醒期
- E. 持续性深昏迷

【正确答案】D

【答案解析】硬脑膜外血肿病人的意识障碍有3种类型,典型的意识障碍是伤后昏迷有“中间清醒期”,即伤后原发性脑损伤的意识障碍清醒后,在一段时间后颅内血肿形成,因颅内压增高导致病人再度出现昏迷。

知识点 61:

糖尿病并发症

- ①酮症酸中毒: 严重的急性并发症
- ②高渗性非酮症糖尿病昏迷
- ③感染
- ④大、中血管病变: 动脉粥样硬化
- ⑤微血管病变: 肾脏病变+视网膜病变
- ⑥神经病变: 周围神经病为常见
- ⑦眼部病变: 白内障+青光眼+屈光改变
- ⑧糖尿病足

【例题】下列不属于糖尿病慢性并发症的是

- A. 神经病变
- B. 冠心病
- C. 视网膜病变
- D. 贫血
- E. 肾病

【正确答案】D

【答案解析】糖尿病慢性并发症包括大血管病变(即心脑血管疾病、下肢动脉硬化等)、微血管病变(即糖尿病肾病、糖尿病性视网膜病变等)、神经病变、糖尿病足等。贫血不是糖尿病的慢性并发症。

知识点 62:

酮症酸中毒治疗首要、极其关键的措施: 静脉输液。

【例题】糖尿病酮症酸中毒治疗的首要、关键措施为

- A. 胰岛素治疗
- B. 补液治疗
- C. 纠正酸中毒
- D. 纠正电解质紊乱
- E. 加强护理

【正确答案】B

【答案解析】输液是抢救糖尿病酮症酸中毒的关键措施。

知识点 63:

有机磷口服中毒者：清水+生理盐水+2%碳酸氢钠（敌百虫忌用）。

【例题】有机磷农药中毒后，不能用碱性溶液洗胃的是

- A. 敌百虫
- B. 敌敌畏
- C. 乐果
- D. 氧乐果
- E. 乙硫磷

【正确答案】A

【答案解析】绝大多数有机磷农药在碱性溶液中很快分解而失去毒力，但敌百虫在碱性溶液中则变为毒性更大的敌敌畏。

知识点 64:

高分辨 CT 检查显示管壁增厚的柱状扩张和成串成簇的囊样改变，已是支气管扩张主要诊断方法。

【例题】目前诊断支气管扩张的主要方法是

- A. 胸部 X 线检查
- B. 痰涂片或细菌培养
- C. 高分辨率 CT 检查
- D. 血气分析
- E. 血常规检查

【正确答案】C

【答案解析】高分辨 CT 检查显示管壁增厚的柱状扩张和成串成簇的囊样改变，已是主要诊断方法。

知识点 65:

肺炎球菌肺炎典型者痰液: 铁锈色。

【例题】肺炎球菌肺炎患者最具特征性的症状是

- A. 寒战、高热
- B. 胸痛
- C. 咳嗽
- D. 呼吸困难
- E. 咳铁锈色痰

【正确答案】E

【答案解析】寒战、高热是许多感染性疾病的共同临床表现,不具有特征性,排除A;胸痛可见于胸廓内脏器病变、神经病变、血管、骨骼病变等,如肋骨骨折,故排除B;咳嗽可见于慢支、肺癌、肺结核、支气管扩张等疾病,与题干不符,可排除C;呼吸困难可见于任何缺氧状态,如心力衰竭,排除D;而肺炎球菌肺炎在红色肝样变期肺泡腔内的红细胞被巨噬细胞吞噬,形成含铁血黄素,经痰液排出,故痰液呈铁锈色。

知识点 66:

心室颤动是心肌梗死病人 24 小时内死亡的主要原因。

【例题】患者男性,50 岁因突发急性心肌梗死而住院治疗,住院病情不稳定,20 小时后死亡,其主要死亡原因可能是

- A. 心律失常
- B. 心室壁瘤
- C. 发热
- D. 心源性休克
- E. 心力衰竭

【正确答案】A

【答案解析】急性心肌梗死约有 75%~95% 的患者发生心律失常,是急性心肌梗死患者早期死亡的主要原因。

知识点 67:

急性左心衰竭表现为强迫端坐位, 频繁咳嗽, 发生急性肺水肿时咳大量粉红色泡沫样痰。

【例题】急性肺水肿最突出的表现是

- A. 咯少量血
- B. 咳大量脓痰
- C. 咳大量白色泡沫痰
- D. 咳大量粉红色泡沫痰
- E. 咯大量血

【正确答案】D

【答案解析】本题考查了急性肺水肿的特征性表现。急性肺水肿表现为剧烈的气喘、端坐呼吸、极度焦虑和咳吐含泡沫的黏液痰, 粉红色泡沫样痰、发绀等为典型症状。故本题备选答案中较为准确的是选项 D 即咳大量粉红色泡沫痰。

知识点 68:

糖皮质激素是当前防治哮喘最有效的抗炎药物。

【例题】防治哮喘最有效的药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 抗胆碱能药物
- C. 茶碱类
- D. 肥大细胞膜稳定剂
- E. β_2 -受体激动剂

【正确答案】A

【答案解析】糖皮质激素: 主要通过多环境阻止呼吸道炎症的发展及降低呼吸道高反应性, 是当前防治哮喘最有效的抗炎药物。可采用吸入、口服和静脉用药。

知识点 69:

宫颈癌普查: 宫颈刮片细胞学检查。

【例题】筛查早期宫颈癌最常用的方法是

- A. 碘实验

- B. 阴道镜检查
- C. 宫腔镜检查
- D. 宫颈刮片细胞学检查
- E. 宫颈活体组织检查

【正确答案】D

【答案解析】宫颈刮片细胞学检查常用于宫颈癌筛查。

知识点 70:

破伤风芽孢梭状杆菌为革兰氏阳性厌氧菌，在含氧较低的环境中生长繁殖。

【例题】引起新生儿破伤风的病原体是

- A. 革兰阴性厌氧芽孢杆菌
- B. 革兰阴性需氧芽孢杆菌
- C. 革兰阳性厌氧芽孢杆菌
- D. 革兰阴性厌氧杆菌
- E. 革兰阳性需氧芽孢杆菌

【正确答案】C

【答案解析】新生儿破伤风是指破伤风梭状芽胞杆菌经脐部侵入引起的中枢神经系统严重中毒感染，破伤风梭状芽胞杆菌为革兰阳性厌氧菌。

知识点 71:

呼吸困难、心绞痛和晕厥为典型的主动脉狭窄三联征。

【例题】男性患者李宏，33岁，患风湿性心脏病主动脉瓣狭窄15年，患者常出现的三联征为

- A. 呼吸困难、心绞痛和晕厥
- B. 呼吸困难、心绞痛和肺部感染
- C. 呼吸困难、心绞痛和周围血管征
- D. 呼吸困难、晕厥和肺部感染
- E. 呼吸困难、晕厥和周围血管征

【正确答案】A

【答案解析】劳力性呼吸困难、心绞痛、晕厥是主动脉瓣狭窄典型的三联症。

知识点 72:

上尿路结石主要表现是与活动有关的疼痛和血尿。

【例题】上尿路结石典型的症状是

- A. 尿频+尿痛
- B. 腰痛+血尿
- C. 腰痛+脓尿
- D. 尿频+血尿
- E. 腰痛+无尿

【正确答案】B

【答案解析】上尿路结石主要表现是与活动有关的疼痛与血尿。

知识点 73:

轮状病毒肠炎表现:大便量多,呈黄色水样或蛋花汤样,无腥臭味,常伴有脱水、酸中毒。大便镜检偶见少量白细胞。

【例题】轮状病毒肠炎的患儿大便的颜色和形状为

- A. 黄色水样,或蛋花汤样,无腥臭味
- B. 蛋花汤样或水样,混有粘液
- C. 水样便,脓血便
- D. 黏冻样,有腥臭味
- E. 稀糊状,带有黏液,脓血便

【正确答案】A

【答案解析】秋、冬季流行,多见于6~24个月的婴幼儿,潜伏期1~3天,起病较急,常伴有上呼吸道感染症状,一般无明显中毒症状。大便量多,呈黄色水样或蛋花汤样,无腥臭味,常伴有脱水、酸中毒。

知识点 74:

急性气管-支气管炎饮食:高蛋白、高维生素、高热量的饮食。每天保证饮水在

1500ml 以上, 利于痰液的稀释和排出。

【例题】急性气管-支气管炎患者在病情允许情况下每天饮水量为

- A. >500ml
- B. >800ml
- C. >1000ml
- D. >1300ml
- E. >1500ml

【正确答案】E

【答案解析】在病人病情允许时, 鼓励病人多饮水, 每天保证饮水在 1500ml 以上, 足够的水分可保证呼吸道黏膜的湿润和病变黏膜的修复, 有利于痰液的稀释和排出。

知识点 75:

足月新生儿应保持病室干净、清洁、整齐, 阳光充足、空气流通, 温度 22~24℃, 湿度 55%~65%。

【例题】新生儿的室内温度是

- A. 16~18℃
- B. 18~20℃
- C. 20~22℃
- D. 22~24℃
- E. 24~26℃

【正确答案】D

【答案解析】新生儿房间温度应保持于 22~24℃, 湿度 55%~65%, 空气清新, 通风良好。冬季环境温度过低时可引起新生儿(特别是低体重儿)体温不升, 影响代谢和血液循环, 应注意保暖。另经临床验证, 新生儿病室内温度保持在 22~24℃时最适宜。

知识点 76:

肺功能检查是判断气流受限的主要客观指标, 对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的诊断、

严重程度评价、疾病进展、预后及治疗反应等有重要意义。

【例题】患者，男性，60岁。诊断为慢性阻塞性肺疾病。现需判断患者气流受限情况，应采取的检查是

- A. 痰培养
- B. X线检查
- C. 血细胞计数
- D. 肺功能检查
- E. 动脉血气分析

【正确答案】D

【答案解析】肺功能检查是判断气流受限的主要客观指标，对慢性阻塞性肺疾病（COPD）诊断、严重程度评价、疾病进展、预后及治疗反应等有重要意义。

知识点 77:

胃镜及活组织检查为最可靠的确诊方法，可通过活检确定胃炎的类型。

【例题】患者男性，52岁。因反复上腹部隐痛伴嗝气、食欲减退3个月，经检查诊断为“慢性胃炎”，下列项目中，最有诊断意义的是

- A. 消化道症状
- B. 胃液分析
- C. 胃镜检查
- D. 血清学检查
- E. 胃肠钡餐X线检查

【正确答案】C

【答案解析】胃镜及活组织检查：为最可靠的确诊方法，可通过活检确定胃炎的类型。由于慢性胃炎病变可呈灶性分布，活检应多部位取材。

知识点 78:

上腹部腹痛是消化性溃疡主要症状。GU疼痛多位于剑突下正中或偏左，DU疼痛常在上腹正中或偏右。

【例题】消化性溃疡的主要症状是

- A. 上腹痛
- B. 恶心、呕吐
- C. 营养不良
- D. 贫血
- E. 便血

【正确答案】 A

【答案解析】 上腹痛为消化性溃疡的主要症状。

知识点 79:

肝硬化饮食：高热量、高蛋白质、高维生素、低盐易消化食物。肝功能显著损害或有肝性脑病先兆时，应限制或禁食蛋白质。

【例题】对肝硬化的病人健康教育不妥的是

- A. 低盐、高蛋白饮食
- B. 避免刺激性食物
- C. 可以饮啤酒
- D. 血氨偏高限蛋白质
- E. 高热量、高维生素饮食

【正确答案】 C

【答案解析】 肝硬化病人禁止饮酒。

知识点 80:

新生儿寒冷损伤综合征最先出现的皮肤硬肿部位在小腿。

【例题】新生儿硬肿症最先出现硬肿的部位

- A. 面颊部
- B. 上肢
- C. 躯干
- D. 小腿
- E. 臀部

【正确答案】 D

【答案解析】硬肿发生的顺序是小腿→大腿外侧→下肢→臀部→面颊→上肢→全身。

知识点 81:

II型呼衰: 如 COPD 引起的慢性呼衰, 应采取低浓度 $<30\% \sim 35\%$ 持续给氧, 这样既能纠正缺氧又能防止 CO_2 潴留的加重。

【例题】赵女士, 诊为慢性呼吸衰竭, 近日咳嗽、咳痰、气促明显, 又出现神志不清、发绀、多汗, 血气分析 $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 62\text{mmHg}$, 应给予患者

- A. 高浓度、高流量持续吸氧
- B. 高浓度、高流量间歇吸氧
- C. 低浓度、低流量持续吸氧
- D. 低浓度、低流量间歇吸氧
- E. 酒精湿化给氧

【正确答案】C

【答案解析】此题考查慢性 II 型呼吸衰竭患者氧疗的原则, 是常见的考查内容, 也是护士必须掌握的内容。根据题干给出的动脉血气分析数值, 该患者为慢性 II 型呼吸衰竭, 其氧疗的原则是持续低流量吸氧。

知识点 82:

肋骨骨折的好发部位: 第 4~7 肋骨。

【例题】最易骨折的肋骨是

- A. 第 1~2 肋
- B. 第 2~3 肋
- C. 第 8~10 肋
- D. 第 4~7 肋
- E. 第 11~12 肋

【正确答案】D

【答案解析】肋骨骨折多数是外来暴力所致, 可分为直接暴力和间接暴力, 以 4~7 肋骨折最为多见。

知识点 83:

巨幼细胞贫血病因: 叶酸和 (或) 维生素 B₁₂ 缺乏。

【例题】诊断巨幼细胞性贫血的重要指标是

- A. 叶酸和维生素 B₁₂ 测定
- B. 骨髓象
- C. 胃液分析
- D. 血常规
- E. 内因子抗体测定

【正确答案】A

【答案解析】巨幼细胞性贫血是由于叶酸和 (或) 维生素 B₁₂ 缺乏所引起的一类大细胞性贫血。所以血清叶酸和维生素 B₁₂ 测定对本病诊断有重要价值。

知识点 84:

妊娠期高血压基本病理变化: 全身小动脉痉挛。

【例题】某孕妇, 孕前基础血压为 120/80mmHg。孕 30 周时出现下肢水肿, 头痛头晕, 查体血压 150/100mmHg, 蛋白尿 (+), 诊断为妊娠期高血压疾病, 患者出现上述症状的病理生理变化基础是

- A. 底蜕膜出血
- B. 全身的小动脉痉挛
- C. 水钠潴留
- D. 内分泌功能失调
- E. 肾小管重吸收功能降低

【正确答案】B

【答案解析】妊高症的病理生理改变较为明确, 主要是由于全身小动脉的痉挛, 造成管腔狭窄, 周围阻力增大, 以及血管内皮损伤, 从而表现为高血压、蛋白尿和肢体水肿等。严重时可引起颅内病变而发生先兆子痫或子痫, 对母儿均构成严重威胁。

知识点 85:

餐后 2 小时血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 和(或)空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 即可诊断为糖尿病。

【例题】糖尿病静脉血浆葡萄糖诊断标准是

- A. 空腹 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 或餐后 2 小时 $\geq 11.1\text{mmol/L}$
- B. 随机 $\geq 7.8\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.0\text{mmol/L}$
- C. 随机 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.8\text{mmol/L}$
- D. 随机 $\geq 6.1\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.0\text{mmol/L}$
- E. 随机 $\geq 6.1\text{mmol/L}$ 或空腹 $\geq 7.8\text{mmol/L}$

【正确答案】 A

【答案解析】 餐后 2 小时血糖: $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 和/或空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 即可诊断为糖尿病。

知识点 86:

心肌梗死早期诊断及判断溶栓是否成功的重要指标: 肌酸激酶同工酶 CK-MB。

【例题】下列心肌坏死标志物中为判断溶栓是否成功的重要指标的是

- A. 肌红蛋白
- B. cTnI
- C. cTnT
- D. LDH
- E. CK-MB

【正确答案】 E

【答案解析】 本题考查了急性心肌梗死患者溶栓治疗的护理。考点在溶栓是否成功的判断标准。溶栓后可根据下列指标间接判断溶栓是否成功: ①胸痛 2 小时内基本消失; ②心电图的 ST 段于 2 小时内回降 $> 50\%$; ③2 小时内出现再灌注性心律失常; ④血清 CK-MB 酶峰提前出现 (14 小时以内), 或根据冠状动脉造影直接判断冠状动脉是否再通。

知识点 87:

腹胀、食欲减退、恶心、呕吐是右心衰竭最常见的表现。主要原因是胃肠道及肝

淤血。

【例题】右心衰患者常有食欲减退、恶心、呕吐、腹痛等，是由于

- A. 肺循环淤血
- B. 胃肠道淤血
- C. 迷走神经反射增强
- D. 交感神经反射增强
- E. 左心室扩大压迫膈肌

【正确答案】B

【答案解析】胃肠道及肝淤血引起腹胀、食欲减退、恶心、呕吐等是右心衰竭最常见的症状。

知识点 88:

治疗 SLE 的主要药物：肾上腺皮质激素。

【例题】SLE 药物治疗首选

- A. 青霉素
- B. 泼尼松
- C. 布洛芬
- D. 硫唑嘌呤
- E. 环磷酰胺

【正确答案】B

【答案解析】糖皮质激素目前是治疗 SLE 的主要药物，具有强有力的抗炎作用和免疫抑制作用，能缓解急性期症状，逆转病情。

知识点 89:

前置胎盘主要症状：妊娠晚期或临产时，发生无诱因、无痛性反复阴道流血。

【例题】孕妇，妊娠 37 周，无诱因性阴道出血约 200ml，腹部检查：腹软无压痛，胎位清楚，胎心 158 次/分，阴道可见少量活动性出血，最可能的诊断是

- A. 胎盘早剥
- B. 早产

- C. 前置胎盘
- D. 妊高征
- E. 凝血功能障碍

【正确答案】 C

【答案解析】前置胎盘的主要症状是无诱因、无痛性反复阴道流血，阴道可见少量活动性出血符合前置胎盘的表现。

知识点 90:

慢性再障的首选药: 雄激素。

【例题】治疗慢性再障的首选药是

- A. 雌激素
- B. 雄激素
- C. 生长因子
- D. 维生素 B₁₂
- E. 免疫抑制剂

【正确答案】 B

【答案解析】雄激素为治疗慢性再障首选药物，作用机制可能是刺激肾脏产生红细胞生成素，对骨髓有直接刺激红细胞生成作用。

知识点 91:

肾盂肾炎主要致病菌: 大肠杆菌。

【例题】肾盂肾炎患者尿路感染最常见的致病菌为

- A. 肠球菌
- B. 克雷伯杆菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 副大肠杆菌
- E. 粪链球菌

【正确答案】 C

【答案解析】肾盂肾炎为细菌直接引起的感染性肾脏病变，致病菌以肠道细菌最

多, 大肠杆菌(又叫大肠埃希菌)约占 60%~80%, 其次依次是副大肠杆菌、变形杆菌、葡萄球菌、粪链球菌、产碱杆菌、铜绿假单胞菌等, 偶见厌氧菌、真菌、病毒和原虫感染。

知识点 92:

消化性溃疡发生起关键作用的是胃酸。

【例题】胃十二指肠溃疡的最基本的病因是

- A. 饮食不调
- B. 遗传因素
- C. 胃酸分泌过少
- D. 胃酸分泌过多
- E. 精神神经因素

【正确答案】D

【答案解析】溃疡病的病因较复杂, 主要致病因素是胃酸分泌过多, 由于胃酸分泌过多, 激活胃蛋白酶, 可使胃十二指肠发生“自身消化”, 从而出现溃疡。

知识点 93:

区别脑出血和脑血栓形成的最可靠依据是: 脑 CT 检查。

【例题】目前区别脑出血和脑血栓形成的最可靠依据是

- A. 发病急缓
- B. 瘫痪程度
- C. 昏迷深浅
- D. 脑脊液检查
- E. 脑 CT 检查

【正确答案】E

【答案解析】脑出血发病后出血区域经 CT 检查出现边界清楚的高密度影; 脑血栓形成 24 小时以后脑梗死区 CT 检查出现低密度灶。

知识点 94:

感染是急性气管-支气管炎最主要的病因，过度劳累、受凉是常见诱因。

【例题】急性气管-支气管炎的最常见病因是

- A. 细菌感染
- B. 物理刺激
- C. 化学刺激
- D. 过敏
- E. 过度劳累

【正确答案】A

【答案解析】病毒或细菌感染是急性气管-支气管炎最常见的病因。

知识点 95:

肾病综合征尿蛋白定性一般为+++~++++，24 小时尿蛋白定量超过 3.5g。

【例题】肾病综合征患者 24 小时尿蛋白量为

- A. 大于 150mg
- B. 小于 1g
- C. 小于 1.5g
- D. 1~3g
- E. 大于 3.5g

【正确答案】E

【答案解析】肾病综合征患者尿液检查：尿蛋白定性一般为+++~++++，24 小时尿蛋白定量测定>3.5g。

知识点 96:

妊娠合并心脏病的孕妇最危险的时期：妊娠 32~34 周、分娩期及产后 3 日内。

【例题】心脏病产妇产后最易发生心衰的时间是产后

- A. 3 天
- B. 7 天
- C. 10 天
- D. 2 周

E. 4 周

【正确答案】 A

【答案解析】 产后 3 天内，尤其 24 小时内，仍是心力衰竭发生的危险期，产妇应充分休息且需严密监护。

知识点 97:

急性肾炎的表现：水肿（最常见）、血尿（首发症状）、高血压。可出现一过性氮质血症。

【例题】急性肾小球肾炎的首发症状是

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 水肿
- D. 高血压
- E. 少尿

【正确答案】 A

【答案解析】 急性肾小球肾炎，一般于起病前 1~3 周有感染史，多见于儿童，首发症状往往是血尿，并且 100% 出现。其中 40% 为肉眼血尿，可伴有程度不同的蛋白尿，极个别患者可以表现为肾病综合征。大多数者有水肿，而且是晨起的眼睑水肿或者双下肢水肿，可以出现一过性的高血压，个别严重会出现少尿，以及急性肾损伤，心功能衰竭和高血压脑病。

知识点 98:

心脏复苏的首选药：肾上腺素。

【例题】心搏骤停病人首选的复苏药物是

- A. 阿托品
- B. 碳酸氢钠
- C. 利多卡因
- D. 肾上腺素
- E. 异丙肾上腺素

【正确答案】D

【答案解析】肾上腺素是心脏复苏的首选药，能增强心传导系统的自律性和心脏收缩力，提高血压，并能使心室纤颤由细颤转为粗颤，使除颤器效果更好。

知识点 99:

颈静脉搏动增强、充盈、怒张是右心衰竭的最主要体征，肝颈静脉反流征则更具特征性。

【例题】下列哪项不是右心衰竭的体征

- A. 肝大
- B. 胸腔积液
- C. 肺部湿啰音
- D. 颈静脉怒张
- E. 肝颈静脉回流征阳性

【正确答案】C

【答案解析】本题考查了右心衰竭的体征。右心衰竭患者可出现体循环淤血，导致心源性水肿，严重者可有胸腔积液和腹水出现；同时由于脏器淤血可出现肝大、颈静脉怒张和肝颈静脉回流征阳性等体征。肺部湿啰音是左心衰竭的典型体征。

知识点 100:

急性乳腺炎最常见的病因：乳汁淤积。

【例题】急性乳腺炎的主要病因是

- A. 乳头破损
- B. 乳头内陷
- C. 乳汁淤积
- D. 乳汁过多
- E. 乳管堵塞

【正确答案】C

每日一练 仿真试卷 组队打卡 大量习题免费刷!

扫描二维码去做题



正保医学教育网

www.med66.com